



治疗资料

硬化剂注射疗法 Sclerotherapy Injection

简介

硬化剂注射疗法是把药物直接注射在血管内，药物刺激血管的内膜，使血管内肿胀及黏附在一起，产生血栓。经过一段时间后，血管内便会形成纤维化组织，然后逐渐消退。

治疗效果

可消除静脉曲张及蜘蛛状静脉曲张。

治疗过程

1. 毋须在麻醉下进行。
2. 用细针把药物直接注射在血管内，期间可能会有 1 至 2 分钟轻微不适及绞痛抽搐。

可能出现的风险及并发症

1. 轻微的影响，如痒
2. 注射部位发红
3. 注射位置附近出现瘀伤
4. 较大的静脉变成硬块及硬化
5. 短暂性色素沉淀
6. 新血管形成

** 可能出现之风险或并发症未能尽录。患者应明白无论治疗如何妥善，仍有出现并发症的风险。

治疗前的准备

1. 医生会向患者解释治疗的原因、过程及可能出现之并发症，患者明白后便须签署同意书。
2. 请告知医生及护士所有以往病史、曾进行过的手术、最近所服用的药物及因药物或麻醉剂而引致的并发症。如正服用影响血液凝固的药物，例如阿斯匹林(Aspirin)、华法林(Warfarin)、拜瑞妥(Xarelto)或百达生(Pradaxa)及中药，请尽早通知医生。
3. 请勿在患肢涂乳液。
4. 怀孕、喂母乳、慢性病患者或长期卧床患者不宜进行此治疗。

出院后注意事项

1. 穿压力袜可为治疗中的血管加压。
2. 如有需要，可服医生处方止痛药。
3. 最少 48 小时，请勿：
 - 服阿斯匹林(Aspirin)、布洛芬(Ibuprofen)或其他消炎药(Anti-inflammatory drugs)
 - 洗热水浴
 - 洗按摩浴或桑拿浴
 - 直接暴露在阳光下
4. 可如常沐浴，可使用少量肥皂及温水清洗注射部位。
5. 请勿在治疗后的 2 天内进行任何带氧体能活动。
6. 如傷口部位的疼痛加劇及出現紅腫、腹股沟 13 厘米内发炎、患肢突然肿胀、注射部位轻微溃疡、寒颤、發燒(體溫達 38°C 或以上)或其他異常情況等，請即聯絡主診醫生或回院治疗。
7. 請按時复診。

如您对此治疗有任何疑问或忧虑，请联络主诊医生。

经过医生的悉心诊治，相信您会逐渐康复，并祝生活愉快！

若您阅读此章程后有任何查询，请记住相关问题，以便医生作出跟进。祝阁下顺利安好！

由仁安医院手术室管治委员会编辑

以上资料只供参考，详情请向主诊医生查询
本院保留一切删改此章程之权利，而不作另行通知