



程序資料

肝臟活組織檢查 Liver Biopsy

簡介

肝臟活組織檢查是一項切除一小塊肝組織，用以診斷及檢查懷疑肝臟組織的病變。肝組織樣本可以透過經皮及穿刺活檢、經頸靜脈芯針、腹腔鏡檢查、開放性手術和超聲波引導下注射而取得組織。如患有急性或慢性肝炎、肝功能異常、肝衰竭或肝硬化等症狀，便建議進行此檢查。

治療成效

肝臟活組織檢查可為病人提供有用資料，以診斷病因、評估病情及制定日後治療方案。

檢查過程

1. 此檢查會在局部或全身麻醉下進行；
2. 在皮膚上開一小孔；
3. 病人需屏住呼吸，把穿刺針透過小孔放進肝臟，然後抽取肝組織。
4. 肝活組織會被送往病理部化驗。

可能出現的風險及併發症

1. 疼痛
2. 感染
3. 出血
4. 周邊器官受損

** 可能出現之風險或併發症未能盡錄。病人應明白無論程序如何妥善，仍有出現併發症的風險。

檢查前的預備

1. 保持個人衛生可預防外科傷口感染。
2. 醫生會向病人解釋施行檢查的原因、過程及可能出現之併發症，病人明白後便可簽署同意書。
3. 請告知醫生及護士所有以往病歷、曾進行過的手術、最近所服用的藥物及因藥物或麻醉而引致的併發症。如正服用影響血液凝固的藥物，例如阿士匹靈(Aspirin)、華法林(Warfarin)、拜瑞妥(Xarelto)或百達生(Pradaxa)及中藥，請儘早通知醫生。
4. 根據醫生指示，檢查前數天可能需要停用薄血藥。
5. 檢查前6小時禁止飲食。
6. 病人可能需要進行血液測試。
7. 病人需保持仰臥姿勢。

檢查後須知

1. 護理人員會密切監察病人的脈搏及血壓。
2. 檢查後的數分鐘至數小時內可能會出現輕微上腹痛。
3. 待病人情況穩定後便可恢復正常飲食。

出院後注意事項

1. 為防止傷口部位出血，請勿在檢查後的兩週內進行劇烈活動或運動。
2. 如傷口部位的痛楚加劇及出現紅腫、暈眩、休克、劇烈腹痛、寒顫、發熱(體溫達 38°C 或 100.4°F 以上)或其他異常情況等，請即聯絡主診醫生或回院診治。
3. 請於指定日期、時間及地點覆診。

如病人對此程序有任何疑問或憂慮，請聯絡主診醫生。

經過醫生的悉心診治，相信病人會逐漸康復，並祝生活愉快！

若病人閱讀此單張後有任何查詢，請記下相關問題，以便醫生作出跟進。

由仁安醫院手術室管治委員會編輯

以上資料只供參考，詳情請向主診醫生查詢
本院保留一切刪改此單張之權利，而不作另行通知