



## 程序資料

# 疣電烙術 Cauterization of Warts

### 簡介

疣屬良性皮膚增生，由於皮膚表層受病毒(人類乳頭瘤病毒)感染而引致。疣病毒具傳染性，它可通過接觸或觸摸而傳播。

有多種方法可以治療疣，通常會根據病人的狀況及疣的種類而決定，若其他治療方法無效，手術則會是最快捷及安全的選擇，最常見的手術包括外科電刀及刮除術，以及激光手術。

### 治療成效

疣可被切除，但並不能徹底破壞病毒，所以會有可能復發，或在其他部位長出新疣。治療前請聯絡你的醫生商討及定立個人治療方案。

### 治療過程

1. 治療會在局部麻醉下進行
2. 外科電刀及刮除術  
利用電力燒灼患處，然後使用刀或小工具切除疣
- 激光手術  
利用激光燒灼疣
3. 以無菌敷料覆蓋傷口

### 可能出現的風險及併發症

1. 傷口感染
2. 傷口出血
3. 形成疤痕
4. 燒傷

\*\* 可能出現之風險或併發症未能盡錄。病人應明白無論程序如何妥善，仍有出現併發症的風險。如手術後出現嚴重併發症時，可能需要進行其他治療程序以處理這些併發症。

### 治療前的預備

1. 保持個人衛生可預防外科傷口感染。
2. 醫生會向病人解釋施行治療的原因、過程及可能出現之併發症，病人明白後便可簽署同意書。
3. 請告知醫生及護士所有以往病歷、曾進行過的手術、最近所服用的藥物及因藥物或麻醉而引致的併發症。

## 出院後注意事項

1. 為防止感染，傷口必須保持清潔，需要用防水敷料覆蓋數天。
2. 治療部位周邊會形成軟痂，軟痂會自行脫落及留下小痂。
3. 首 24 小時傷口可能會有出血現象，可輕輕按壓出血處十分鐘止血。
4. 以下是預防疣傳播的建議：
  - 請勿挖或刮疣
  - 請勿觸摸其他人士的疣
  - 保持足疣乾爽
  - 在公眾浴室、更衣室及泳池應穿著鞋
5. 如傷口部位大量出血、疼痛、腫脹、發紅及滲水、疣附近皮膚發紅及熱、寒顫、發熱(體溫高達 38°C 或 100.4°F 以上)或其他異常情況等，請即聯絡主診醫生或回院診治。
6. 請於指定日期、時間及地點覆診。

如病人對此程序有任何疑問或憂慮，請聯絡主診醫生。

經過醫生的悉心診治，相信病人會逐漸康復，並祝生活愉快！

若病人閱讀此單張後有任何查詢，請記下相關問題，以便醫生作出跟進。

---

---

---

由仁安醫院手術室管治委員會編輯

以上資料只供參考，詳情請向主診醫生查詢  
本院保留一切刪改此單張之權利，而不作另行通知