



檢查資料

傾斜牀檢查 Tilt Table Test

簡介

傾斜牀檢查用以診斷病人是否患有血管迷走神經性暈厥（經常性暈厥），這是一類自主神經系統的問題，因身體對腎上腺素的刺激產生異常反應，使血壓或心跳突然下降，引致暈厥。

預期成效

此檢查能診斷血管迷走神經性暈厥。一經診斷，可能有針對性之治療。如沒有進行此項檢查，或未必能準確判斷暈厥的原因。

檢查過程

1. 病人需平臥在傾斜牀上，醫護人員會以束縛帶固定病人位置。
2. 醫護人員會定時監察病人的血壓和心電圖。
3. 平臥一段時間後，傾斜床會被調校至接近直立水平，病人需要站在腳踏上。
4. 若病人於站立期間出現暈厥、休克或血壓驟降等症狀，醫護人員會立即把傾斜牀調回平臥及停止此項檢查。通常病人會很快復原。
5. 若病人於站立期間沒有出現以上症狀，醫生可能會處方定量的硝酸甘油讓病人舌下含服。用藥後，病人可能會出現短暫的頭痛或噁心之現象。
6. 此檢查約需 90 分鐘。



圖片來源：

<https://www.advancedcardiovascular.org/services-williamsburg/cardiac-diagnostic-testing/tilt-table-testing/>

可能出現的風險及併發症

1. 暫時性心臟停頓

** 可能出現之風險或併發症未能盡錄。病人應明白無論檢查如何妥善，仍有出現併發症的風險。

檢查前的預備

1. 醫生會向病人解釋施行檢查的原因、程序及可能出現之併發症，病人明白後便可簽署同意書。
2. 請告知醫生及護士所有以往病歷、曾進行過的手術、最近所服用的藥物，及因藥物或麻醉而引致的併發症。
3. 如果病人在檢查前已知有以下任何狀況，請告知醫生和護士：
 - 懷孕
 - 左心室流出道梗阻或肥厚型心肌病
 - 腦血管疾病（曾經中風或腦溢血）
 - 二尖瓣狹窄
 - 心臟、腎臟或肝臟衰竭
4. 檢查前 4-6 小時禁止飲食。
5. 檢查通常會在門診或入院進行。
6. 請依照醫生指示停止服食藥物。（如適用）
7. 請由親友陪同前來檢查。
8. 請脫下身上所有個人物品（例如內衣褲、假牙、飾物和隱形眼鏡等），然後換上手術衣。
9. 檢查前請先排清小便。

檢查後須知

1. 病人需要休息二十至三十分鐘，獲醫護人員同意後方可離院。
2. 如無不適，便可恢復正常飲食。
3. 如因檢查而停用某些藥物，請依從醫生指示恢復服用/繼續停用該藥物。

如病人對此檢查有任何疑問或憂慮，請聯絡主診醫生。

經過醫生的悉心診治，相信病人會逐漸康復，並祝生活愉快！

若病人閱讀此單張後有任何查詢，請記下相關問題，以便醫生作出跟進。

由仁安醫院手術室管治委員會編輯

以上資料只供參考，詳情請向主診醫生查詢
本院保留一切刪改此單張之權利，而不作另行通知