



程序資料

氟卡尼誘發測試 Flecainide Challenge Test

簡介

氟卡尼誘發測試是把藥物「氟卡尼」注入病人體內，以揭示布魯格達氏症候群 (Brugada Syndrome) (也稱為突然猝死症) 特徵性的心電圖波型變化。布魯格達氏症候群的成因是心臟鈉離子通道變化，引致心跳異常加速。病人可能會感到心悸，嚴重時可能會抽搐、昏厥，甚至突然死亡。

治療成效

透過運用藥物氟卡尼以阻斷鈉離子通道及監測病人的心電圖變化，以診斷其是否患有布魯格達氏症候群。

測試過程

1. 檢查期間，醫護人員會密切監察病人的生命表徵及心律。
2. 把藥物氟卡尼注入病人手臂上的靜脈內。
3. 每3分鐘記錄心電圖一次，以監察病人心臟對氟卡尼的反應。
4. 測試期間，口腔可能會出現金屬味道、感到嘴唇周邊麻痺或複視，這些現象通常會在完成測試後逐漸消退。
5. 若在過程中感到胸痛、暈眩、呼吸急促或有任何不適，應立即通知醫護人員。

可能出現的風險及併發症

1. 心跳過快
2. 心律不整
3. 突然死亡(非常罕見)

** 可能出現之風險或併發症未能盡錄。病人應明白無論程序如何妥善，仍有出現併發症的風險。

程序前的預備

1. 醫生會向病人解釋施行程序的原因、程序及可能出現之併發症，病人明白後便可簽署同意書。
2. 請告知醫生及護士所有以往病歷、曾進行過的手術、最近所服用的藥物及因藥物或麻醉而引致的併發症。
3. 視乎個別情況，請按指示在程序前4-6小時禁止飲食。
4. 視乎個別病情，醫生可能會為病人安排血液測試。

程序後須知

1. 醫護人員會在程序後的6小時內繼續監察病人的心律。
2. 如測試呈陰性反應，病人便可即日出院；如測試呈陽性反應，則建議病人留院一晚以繼續監察心律及進行其它相關檢查。

出院後注意事項

1. 出院後便可恢復正常活動。
2. 請於指定日期、時間及地點覆診。

如病人對此程序有任何疑問或憂慮，請聯絡主診醫生。

經過醫生的悉心診治，相信病人會逐漸康復，並祝生活愉快！

若病人閱讀此單張後有任何查詢，請記下相關問題，以便醫生作出跟進。

由仁安醫院手術室管治委員會編輯

以上資料只供參考，詳情請向主診醫生查詢
本院保留一切刪改此單張之權利，而不作另行通知