



检查资料

氟卡尼诱发测试 Flecainide Challenge Test

简介

氟卡尼诱发测试是把药物「氟卡尼」注入患者体内，以显示布鲁格达氏症候群 (Brugada Syndrome) (也称为突然猝死症) 特征性的心电图波型变化。布鲁格达氏症候群的成因是心脏钠离子通道变化，引致心跳异常加速。患者可能会感到心悸，严重时可能会抽搐、昏厥，甚至突然死亡。

治疗效果

透过药物氟卡尼阻断钠离子通道及监测患者的心电图变化，可诊断是否患有布鲁格达氏症候群。

测试过程

1. 检查期间，医护人员会密切监察患者的生命表征。
2. 把药物氟卡尼注入患者的静脉。
3. 每3分钟记录一次心电图，监察患者心脏对氟卡尼的反应。
4. 测试期间，口腔可能会出现金属味道、感到嘴唇周边麻痹或复视，这些现象通常会在完成测试后逐渐消退。
5. 若在过程中感到胸痛、眩晕、呼吸急促或有任何不适，应立即通知医护人员。

可能出现的风险及并发症

1. 心跳过快
2. 心律不齐
3. 突然死亡(非常罕见)

** 可能出现之风险或并发症未能尽录。患者应明白无论检查如何妥善，仍有出现并发症的风险。

检查前的准备

1. 医生会向患者解释接受检查的原因、过程及可能出现之并发症，患者明白后便须签署同意书。
2. 请告知医生及护士所有以往病史、曾进行过的手术、最近所服用的药物及因药物或麻醉剂而引致的并发症。
3. 根据具体情况，请按指示在检查前4-6小时禁止饮食。
4. 医生可能会为患者安排血液测试。

检查后须知

1. 医护人员会在检查后6小时内持续监察患者的心律。
2. 如测试呈阴性反应，便可即日出院；如测试呈阳性反应，则建议住院一晚监察心律及进行其它相关检查。


出院后注意事项

1. 出院后便可恢复正常活动。
2. 请按时复诊。

如您对此检查有任何疑问或忧虑，请联络主诊医生。

经过医生的悉心诊治，相信您会逐渐康复。

若您阅读此章程后有任何查询，请记下相关问题，以便医生作出跟进。祝阁下顺利安好！



由仁安医院手术室管治委员会编辑

以上资料只供参考，详情请向主诊医生查询
本院保留一切删改此章程之权利，而不作另行通知