



检查资料

抽骨髓及/或活组织检查 Bone Marrow Aspiration and / or Biopsy

简介

骨髓是骨骼内的软组织，有助产生血细胞。

抽骨髓检查的过程会抽出少量液态骨髓，而骨髓活组织检查则会从骨内取出一小片骨及骨髓组织。抽出来的骨髓会送到病理部进行检验。

治疗效果

骨髓检查是帮助医生诊断不同类型血液疾病的最佳方法。

检查过程

抽骨髓

1. 在局部麻醉下进行。
2. 把骨髓抽针放入骨的中央(通常会使用髌骨)。
3. 抽出少量骨髓液。
4. 将针取出及用敷料覆盖穿刺部位。


骨髓切片

1. 此检查会在局部麻醉下进行。
2. 把骨髓抽针放入骨内。
3. 取出一小片骨连骨髓。
4. 将针取出及用敷料覆盖穿刺部位。

可能出现的风险及并发症

1. 穿刺部位出血(通常会在短时间内止血)
2. 感染(罕见)
3. 神经受损(非常罕见)

** 可能出现之风险或并发症未能尽录。患者应明白无论检查如何妥善，仍有出现并发症的风险。



图片来源:

<https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/bone-marrow-aspiration>

检查前准备

1. 医生会向患者解释做检查的原因、过程及可能出现之并发症，患者明白后便须签署同意书。
2. 请告知医生及护士所有以往病史、曾进行过的手术、最近所服用的药物，及因药物或麻醉剂而引致的并发症。如正服用影响血液凝固的药物，例如阿斯匹林(Aspirin)、华法林(Warfarin)、拜瑞妥(Xarelto)或 Pradaxa(百达生)及中药，请尽早通知医生。
3. 现正或怀疑怀孕的女士，请于检查前告知医生。
4. 可能需要进行抽血检查。
5. 检查前请先排清小便。

检查后须知

1. 敷料可即日或翌日摘掉。
2. 可即日出院。

出院后注意事项

1. 首数天，患者可能会感到穿刺部位钝痛，如有需要，可服用医生处方止痛药。
2. 48 小时内，请勿做剧烈运动。
3. 如穿刺部位的疼痛加剧、红肿、出血、渗脓、寒颤、发烧(体温高达 38°C 或以上)或其他异常情况，请即联络主诊医生或回院治疗。
4. 请按时复诊。

如您对此程序有任何疑问或忧虑，请联络主诊医生。

经过医生的悉心诊治，相信您会逐渐康复。

若您阅读此章程后有任何查询，请记下相关问题，以便医生作出跟进。祝阁下顺利安好！

由仁安医院手术室管治委员会编辑

以上资料只供参考，详情请向主诊医生查询
本院保留一切删改此章程之权利，而不作另行通知