

手术资料

请扫描以下二维码以 获取电子档案。




经皮细针抽取(FNA)活组织检查法 Percutaneous Fine Needle Aspiration (FNA) Biopsy

简介

活组织检查法是一项以抽取活组织作疾病检测的程序。经皮细针抽取法 (FNA) 是指将细针经皮肤穿刺到肿块或异常区域,抽取活组织。此程序由有介入放射学专业技能的放射科医生在X光、电脑扫描(CT)或超声波(USG)等医学影像系统的监察下进行。采集到的组织会送交病理部鉴定。

请向主治医生了解相关之风险及优点,并商讨决定最佳的治疗方案。



图片来源: https://www.cirse.org/wp-content/uploads/2018/0 8/Aspiration600x500-600x500.jpg

预期效果

取出组织标本并交予病理学家进行检验以作细胞学或组织学评估。

检查过程

- 1. 此检查在无菌技术下进行;
- 2. 根据情况,可能不需在麻醉下进行,也有可能在局部麻醉下进行;
- 3. 在X光、电脑扫描或超声波的监察下,将细针刺入异常部位,并抽取足够的组织;
- 4. 可能需要多次穿刺和抽取,才能成功取得足够的组织;
- 5. 在针刺部位按压止血,再用无菌敷料保护;
- 6. 将采集到的组织送往化验室检验。

可能出现的风险及并发症

- 1. 针刺部位出血
- 2. 针刺部位感染
- 3. 针刺部位疼痛
- 4. 瘀肿
- 并不是全部FNA检查都是成功的,成功与否要根据有否抽中病变组织,以及是否抽取到足够的组织而定
- 6. 可能需要重复接受FNA检查
- 7. 尽管FNA检查存在并发症的可能,但此检查仍是十分安全的,而且可免除患者接受一些较侵入的检查或手术。总体而言,常見的并发症较轻微,严重的并发症较为罕见。
- ** 可能出现之风险或并发症未能尽录。患者应明白无论检查如何妥善,仍有出现并发症的风险。

检查前的准备

- 1. 保持个人卫生可预防刀口感染。患者在检查当天务必洗澡及洗头。
- 2. 医生会向患者解释施行检查的原因、过程及可能出现之并发症,患者明白后便须签署同意书。
- 3. 请告知医生及护士所有以往病史、曾进行过的手术、最近所服用的药物,及因药物或麻醉剂 而引致的并发症。
- 4. 现正或怀疑怀孕的女士,请于检查前通知职员。
- 一些药物、草药及补充剂会影响凝血功能,检查前数天可能须要停服。
- 6. 根据情况,可能须抽血检查凝血功能,若患者患有凝血功能不良,可能须在检查前补充血制品。
- 7. 根据情况,患者可能须在检查前6小时禁止饮食。
- 8. 根据情况,可能须使用预防性抗生素。
- 9. 医生可能会用手术记号笔标记检查位置,请勿洗掉。
- 10. 根据情况,患者可能须除去身上所有衣物(如内衣裤、假牙、饰物和隐形眼镜等),换上手术衣。
- 11. 检查前请先排清小便。

检查后须知

- 1. 大部分的FNA检查毋须住院,但若活组织须从内脏抽取,则可能需住院数小时。
- 2. 由于针刺的伤口较小,所以敷料可于检查当天稍后时间摘除,或按照医生指示处理。
- 3. 如有不适、伤口出血或剧痛,请即通知医护人员。

出院后注意事项

- 1. 如有需要,可服医生处方止痛药。
- 2. 24小时内避免做剧烈运动。若活组织是从内脏抽取,5天内避免有踫撞的剧烈活动。
- 3. 检查结果会于数天后通知患者。
- 4. 如伤口部位严重疼痛、肿胀、渗血、流脓、寒颤、发烧(体温高达 38℃ 或以上)或其他异常情况,请即联络主诊医生或回院治疗。
- 5. 请按时复诊。

如您对此程序有任何疑问或忧虑,请联络主治医生。

经过医生的悉心治疗,相信您会逐渐康复,并祝生活愉快!

若您阅读此章程后有任何查询,请记下相关问题,以便医生作出跟进。祝阁下顺利安好!

由仁安医院手术室管治委员会编辑

以上资料只供參考,详情请向主诊医生查询 本院保留一切删改此章程之权利,而不作另行通知