

## 手术资料

### 立体定位乳房真空抽组织检查 Stereotactic-Guided Vacuum Assisted Breast Biopsy

#### 简介

立体定位乳房真空抽组织检查是一项微创手术，在局部麻醉下进行。本检查使用以乳房 X-光摄影为基础的立体引导定位技术，配合真空抽组织的粗针，把影像上触摸不到的肿瘤或是乳房钙化点抽出来作进一步检验。

本检查由放射科医生或乳房外科医生负责施行。若抽针的位置太深、太浅或技术上未能到达的位置，则不适合进行本检查。

#### 治疗效果

经此项检查所抽取的组织量比传统抽针技术更多，可以作更准确的病理学分析。分析的目的是希望获取一些关于病变组织的诊断数据。

#### 过程

1. 整个过程，患者需要躺在特制的检查床上；
2. 为配合检查需要，身体必须保持静止不动，而整个过程乳房都会被紧压，因此可能会导致颈部僵硬和身体不适；
3. 乳房患处接受 X-光检查后，电脑会计算出最适合入针的位置。医生会为患者局部麻醉，然后在乳房表皮开一小切口，以便将粗针插入乳房，采取多个组织标本；
4. 完成后，医生可能会将一个微型的钛金属夹置入抽针的位置，作为日后定位用，此金属夹十分安全，适用于磁力共振，患者并不会感觉到它的存在。

#### 可能出现的风险及并发症

1. 穿刺部位出血，形成血肿或瘀青
2. 穿刺口感染
3. 局部麻醉药过敏反应
4. 经胸腔穿刺可引致气胸(较罕见)

\*\* 可能出现之风险或并发症未能尽录。患者应明白无论手术如何妥善，仍有出现并发症的风险，可能需要进行另一手术治疗这些并发症。

## **检查前的准备**

1. 保持个人卫生可预防伤口感染。
2. 此为了一项小手术程序，医生会向患者解释检查的原因、过程及可能出现之并发症，患者明白后便须签署同意书。
3. 请告知医生及护士所有以往病史、曾进行过的手术、最近所服用的药物及因药物或麻醉剂而引致的并发症。如正服用影响血液凝固的药物，例如阿斯匹林(Aspirin)、华法林(Warfarin)、拜瑞妥(Xarelto)或 Pradaxa(百达生)、中草药及营养补充品，请尽早通知医生。
4. 检查前不用限制饮食。
5. 现正或怀疑怀孕的女士，请于检查前通知放射科职员。
6. 请除去身上所有衣物(如内衣裤)，换上手术衣。
7. 检查前请先排清小便。

## **检查后须知**

1. 穿刺口会敷上压力敷料以助止血。
2. 依照医护人员指示处理伤口。
3. 需要时可服医生处方的止痛药。
4. 检查后24小时内请勿做剧烈运动。

## **出院后注意事项**

1. 如穿刺口部位的疼痛加剧及出现红肿、触痛或渗血、寒颤、发烧(体温高达38°C或以上)或其他异常情况，请即联络主诊医生或回院治疗。
2. 请按时复诊。

如您对此检查有任何疑问或忧虑，请联络主诊医生。

经过医生的悉心诊治，相信您会逐渐康复。

若您阅读此章程后有任何查询，请记住相关问题，以便医生作出跟进。祝阁下顺利安好！

---

---

---

由仁安医院手术室管治委员会编辑

以上资料只供参考，详情请向主诊医生查询  
本院保留一切删改此章程之权利，而不作另行通知