



检查资料

大肠钡剂灌肠造影 Barium Enema

简介

大肠钡剂灌肠造影是一个放射诊断检查，由放射科医生用钡造影剂以透视造影的方式为大肠做造影检查。

本检查不适用于患有中毒性巨结肠或伪膜性结肠炎的患者。

适应症

如患者出现下列病征或有以下疑虑，主诊医生可能会建议进行大肠钡剂灌肠造影：

- 腹痛
- 排便习惯改变
- 直肠出血
- 腹泻
- 便秘

检查过程

1. 检查开始时，医生会先将灌肠软管插入肛门。
2. 钡造影剂会由放射科医生经软管注入大肠，过程中会通过 X 光透视造影观察。
3. 过程中放射科医生会决定为患者经静脉注射能使肌肉放松的药物。
4. 由于气体和钡造影剂会使大肠膨胀，患者可能会感到腹部不适。

可能出现的风险及并发症

1. 检查中所用药物引起之副作用
2. 罕见且严重的并发症：
 - 肠穿孔
 - 暂时性菌血症
 - 钡造影剂所引致的过敏反应

** 可能出现的风险或并发症未能尽录。患者应明白无论检查如何妥善，仍有出现并发症的风险，并可能需要进行另一手术治疗这些并发症。

检查前的准备

1. 医生会向患者解释做检查的原因、过程及可能出现之并发症，患者明白后便须签署同意书。
2. 请告知医生及护士所有以往病史、曾进行过的手术、最近所服用的药物及因药物或麻醉剂而引致的并发症。
3. 现正或怀疑怀孕的女士，请于检查前通知放射科职员。
4. 如患有青光眼病，请在检查前告知我们的工作人员。
5. 如最近曾进行过大肠组织活检，请在取组织后最少七天才进行此检查。
6. 请携同所有旧片及报告以咨参考。
7. 检查前一天的饮食请以不含脂肪，低纤维食物为主。
8. 患者将预先收到泻药以清理肠胃。服泻药前3小时内禁食。服药后，仍需禁食，直至完成整个检查。
9. 检查前6小时禁止饮食。
10. 请除去身上所有衣物(如内衣裤、假牙和饰物等)，换上手术衣。
11. 检查前请先排清小便。
12. 如患者为幼儿，请家长替孩子带备尿不湿及衣服以作替换。

检查后须知

1. 检查后数天请多喝水以免便秘。
2. 检查后数天粪便可能会呈白色。
3. 鉴于药物作用可能未完全消退，请勿驾驶或操作重型机械。
4. 患者可恢复正常活动或遵医嘱恢复活动。

如您对此检查有任何疑问或忧虑，请联络主诊医生。

经过医生的悉心诊治，相信您会逐渐康复。

若您阅读此章程后有任何查询，请记住相关问题，以便医生作出跟进。祝阁下顺利安好！

由仁安医院手术室管治委员会编辑

以上资料只供参考，详情请向主诊医生查询
本院保留一切删改此章程之权利，而不作另行通知