



程序資料

小腸鋇劑造影 Barium Follow Through

簡介

小腸鋇劑造影是一個放射診斷檢查利用鋇造影劑來為小腸造影，檢查將由放射科醫生以透視造影進行。

本檢查不適用於穿腸或懷疑穿腸的患者。

適應症

如病人出現下列病徵或有以下疑慮，主診醫生可能會建議病人進行小腸鋇劑造影：

- 腹瀉
- 貧血或消化道出血
- 吸收不良
- 小腸部分阻塞
- 腹部有腫塊

檢查過程

1. 在最初的平片後，病人需服下鋇造影劑。
2. 在之後的一小時，每相隔 15 分鐘會拍下一張平躺或俯臥姿勢的片。之後就會相隔 30 分鐘或 1 小時拍攝，直到鋇造影劑到達直腸為止。
3. 當鋇造影劑到達迴腸末端，醫生會在肚皮表面施加適當壓力，令迴腸不會被其他腸道重疊。

可能出現的風險及併發症

1. 罕見的併發症：
 - 鋇造影劑流到盲腸並造成盲腸炎
 - 鋇造影劑有機會使部分腸阻塞轉變為完全腸阻塞
2. 罕見且嚴重的併發症：
 - 未知的腸穿孔使鋇造影劑流到腹腔
 - 吸入性肺炎
 - 鋇造影劑所引致的敏感反應

** 可能發生之風險或併發症未能盡錄。病人應明白無論程序如何妥善，仍有發生併發症的風險，並可能需要進行另一手術治療這些併發症。

程序前的預備

1. 醫生會向病人解釋施行程序的原因、過程及可能出現之併發症，病人明白後便可簽署同意書。
2. 請告知醫生及護士所有以往病歷、曾進行過的手術、最近所服用的藥物及因藥物或麻醉而引致的併發症。
3. 現正或懷疑懷孕的女士，請於程序前通知放射科職員。
4. 請攜同所有舊片及報告以諮參考。
5. 程序前 6 小時禁止飲食。
6. 請脫下身上衣物(例如內衣、假牙和飾物等)，然後換上手術衣。
7. 程序前請先排清小便。

程序後須知

1. 檢查後數天請多喝水以免便秘。
2. 檢查後數天糞便可能會呈白色。
3. 病人可恢復正常活動或遵循主診醫生的指示恢復活動。

如病人對此程序有任何疑問或憂慮，請聯絡醫療造影部。

經過醫生的悉心診治，相信病人會逐漸康復，並祝生活愉快！

若病人閱讀此單張後有任何查詢，請記下相關問題，以便醫生作出跟進。

由仁安醫院手術室管治委員會編輯

以上資料只供參考，詳情請向主診醫生查詢
本院保留一切刪改此單張之權利，而不作另行通知