



检查资料

胃部钡剂造影 Barium Meal

简介

胃部钡剂造影是一个放射诊断检查，由放射科医生用钡造影剂以透视造影的方式为胃部及十二指肠造影。

本检查不适用于肠穿孔或怀疑肠穿孔的患者。

适应症

如患者出现下列症状或有以下疑虑，主诊医生可能会建议做胃部钡剂造影：

- 消化不良
- 上腹部肿块
- 胃肠道出血（原因不明的贫血）
- 胃肠道部分阻塞

检查过程

1. 检查开始时，患者需站或躺在检查床上。
2. 需服钡造影剂及气粉，使胃部膨胀，胃壁清楚分开，使钡造影剂均匀地附在胃壁上。
3. 过程中放射科医生会要求患者在检查床上转身，然后医生会进行连串 X 光摄影。
4. 过程中由于气体和钡造影剂使肠胃膨胀，可能会感到腹部不适。

可能出现的风险及并发症

1. 罕见的并发症：
 - 钡造影剂流到盲肠并造成盲肠炎
 - 钡造影剂有可能使部分肠阻塞转换为完全肠阻塞
2. 罕见且严重的并发症：
 - 未知的肠穿孔使钡造影剂流到腹腔
 - 吸入性肺炎
 - 钡造影剂所引致的过敏反应

** 可能出现之风险或并发症未能尽录。患者应明白无论检查过程如何妥善，仍有出现并发症的风险，并可能需要进行另一手术治疗这些并发症。

检查前的准备

1. 医生会向患者解释做此检查的原因、过程及可能出现之并发症，患者明白后便须签署同意书。
2. 请告知医生及护士所有以往病史、曾进行过的手术、最近所服用的药物及因药物或麻醉剂而引致的并发症。
3. 现正或怀疑怀孕的女士，请于检查前通知放射科职员。
4. 请携同所有旧片及报告以咨参考。
5. 检查前 6 小时禁止吸烟。
6. 检查前 6 小时禁止饮食。
7. 请除去身上衣物(如内衣、假牙和饰物等)，换上手术衣。

检查后须知

1. 检查后数天请多喝水以免便秘。
2. 检查后数天粪便可能会呈白色。
3. 可恢复正常活动或遵医嘱恢复活动。

如您对此检查任何疑问或忧虑，请联络主诊医生。

经过医生的悉心诊治，相信您会逐渐康复。

若您阅读此章程后有任何查询，请记下相关问题，以便医生作出跟进。祝阁下顺利安好！

由仁安医院手术室管治委员会编辑

以上资料只供参考，详情请向主诊医生查询
本院保留一切删改此章程之权利，而不作另行通知