



## 程序資料

# 子宮輸卵管造影 Hysterosalpingogram (HSG)

### 簡介

子宮輸卵管造影是一個放射診斷檢查利用造影劑來確定輸卵管是否暢通及子宮形狀是否正常的檢查，檢查將由放射科醫生以透視造影進行。

### 適應症

如病人出現下列病徵或有以下疑慮，主診醫生可能會建議病人進行子宮輸卵管造影：

- 檢查不育是否由輸卵管阻塞引起
- 檢查子宮的形狀，以找出反覆流產或異常陰道出血的原因

### 檢查過程

1. 放射科醫生會檢查病人的盆腔位置並將婦科檢查儀器置入陰道內。
2. 清潔子宮頸後，將導管放入子宮頸的開口中，醫生將造影劑注入子宮。
3. 造影劑進入輸卵管後會從末端溢出，由此便知輸卵管是否暢通。
4. 通過觀察 X-光射線圖像，宮腔內的異常亦可一目了然。

### 可能出現的風險及併發症

1. 子宮收縮痛
  - 造影通常會引致輕度或中度的子宮收縮痛，痛楚一般會維持五至十分鐘，部份婦女可能會維持數小時，可服用止痛藥減輕疼痛症狀。
2. 盆腔感染
  - 通常出現在曾患有輸卵管疾病的婦女。在極少數的情況下，盆腔感染可能會破壞輸卵管，甚至需切除輸卵管。如在造影後一至兩天內感到疼痛加劇或發燒，請儘快通知醫生。
3. 頭暈
  - 在極少數的情況下，可能會在子宮輸卵管造影的進行過程中或後的短暫時間內出現頭重腳輕的現象。
4. 造影劑過敏
  - 在極少數的情況下，可能對子宮輸卵管造影中的造影劑過敏。如對碘，其他造影劑或海鮮過敏，應告知醫生，讓醫生以其他合適的造影劑取代。如出現紅疹，瘙癢或腫脹，請儘快通知醫生。
5. 陰道點狀出血
  - 在完成子宮輸卵管造影後的一至兩天會出現陰道點狀出血（通常呈啡色/淺粉紅色），屬正常現象。若發現大量出血，請儘快通知醫生。

\*\* 可能發生之風險或併發症未能盡錄。病人應明白無論程序如何妥善，仍有發生併發症的風險，並可能需要進行另一手術治療這些併發症。

## 程序前的預備

1. 醫生會向病人解釋施行程序的原因、過程及可能出現之併發症，病人明白後便可簽署同意書。
2. 請告知醫生及護士所有以往病歷、曾進行過的手術、最近所服用的藥物及因藥物或麻醉而引致的併發症。
3. 現正或懷疑懷孕的女士，請於程序前通知放射科職員。
4. 請攜同所有舊片及報告以諮參考。
5. 此檢查須在月經週期第八日至第十日進行。
6. 由月經週期開始至檢查進行當天須暫停行房。
7. 請遵照醫生指示服用藥物。
8. 請脫下身上衣物(例如內褲和飾物等)，然後換上手術衣。

## 程序後須知

1. 病人可以恢復正常活動。如有需要，醫生會建議暫停行房數天。
2. 建議由親友陪同離開本院。
3. 請遵照醫生指示服用藥物。

如病人對此程序有任何疑問或憂慮，請聯絡醫療造影部。

經過醫生的悉心診治，相信病人會逐漸康復，並祝生活愉快！

若病人閱讀此單張後有任何查詢，請記下相關問題，以便醫生作出跟進。

---

---

---

由仁安醫院手術室管治委員會編輯

以上資料只供參考，詳情請向主診醫生查詢  
本院保留一切刪改此單張之權利，而不作另行通知