



程序資料

大腸水溶性造影劑灌腸造影 Water Soluble Contrast Enema

簡介

大腸水溶性造影劑灌腸造影是一個放射診療檢查利用水溶性造影劑(主要用於對鋇造影劑有禁忌者)來為大腸造影，檢查將由放射科醫生以透視造影進行。

適應症

如病人出現下列病徵或有以下疑慮，主診醫生可能會建議病人進行大腸水溶性造影劑灌腸造影：

- 腹痛
- 排便習慣改變
- 直腸出血
- 腹瀉
- 便秘
- 手術後檢查康復進度

檢查過程

1. 檢查開始時，醫生會先將灌腸軟管插入肛門。
2. 水溶性造影劑會由放射科醫生注入大腸，過程中會以 X 光透視造影作觀察。
3. 過程中放射科醫生會決定為病人經靜脈注射能使肌肉放鬆的藥物。
4. 過程中由於氣體和水溶性造影劑使大腸膨脹，病人可能會感到腹部不適。

可能出現的風險及併發症

1. 檢查中所用藥物引起之副作用
2. 罕見且嚴重的併發症：
 - 腸穿孔
 - 暫時性菌血症
 - 水溶性造影劑所引致的敏感反應

** 可能發生之風險或併發症未能盡錄。病人應明白無論程序如何妥善，仍有發生併發症的風險，並可能需要進行另一手術治療這些併發症。

程序前的預備

1. 醫生會向病人解釋施行政程序的原因、過程及可能出現之併發症，病人明白後便可簽署同意書。
2. 請告知醫生及護士所有以往病歷、曾進行過的手術、最近所服用的藥物及因藥物或麻醉而引致的併發症。
3. 現正或懷疑懷孕的女士，請於程序前通知放射科職員。
4. 如病人患有青光眼病，請在檢查前告知我們的工作人員。
5. 如病人最近曾進行大腸組織活檢，請在抽取組織後最少七天才進行此檢查。
6. 請攜同所有舊片及報告以諮參考。
7. 檢查前一天的飲食請以不含脂肪，低纖維食物為主。
8. 病人將預先收到瀉藥粉以清理腸胃的排泄物。服瀉藥粉前 3 小時內，不可進食任何固體食品。服用藥粉後，不可進食任何食品，直至完成整個檢查。
9. 程序前 6 小時禁止飲食。
10. 請脫下身上所有衣物(例如內衣褲、假牙和飾物等)，然後換上手術衣。
11. 程序前請先排清小便。
12. 如病人為幼童，請家長替幼童帶備尿片及衣服以作替換。

程序後須知

1. 鑑於藥物藥效可能未完全消退，請避免駕駛或操作重型機械。
2. 病人可恢復正常活動或遵循主診醫生的指示恢復活動。

如病人對此程序有任何疑問或憂慮，請聯絡醫療造影部。

經過醫生的悉心診治，相信病人會逐漸康復，並祝生活愉快！

若病人閱讀此單張後有任何查詢，請記下相關問題，以便醫生作出跟進。

由仁安醫院手術室管治委員會編輯

以上資料只供參考，詳情請向主診醫生查詢
本院保留一切刪改此單張之權利，而不作另行通知