



检查资料

大肠水溶性造影剂灌肠造影 Water Soluble Contrast Enema

简介

大肠水溶性造影剂灌肠造影是一个放射诊疗检查，由放射科医生用水溶性造影剂(主要用于对钡造影剂有禁忌者)以透视造影的方式为大肠造影。

适应症

如患者出现下列症状或有以下疑虑，主诊医生可能会建议患者做大肠水溶性造影剂灌肠造影：

- 腹痛
- 排便习惯改变
- 直肠出血
- 腹泻
- 便秘
- 手术后检查康复进度

检查过程

1. 检查开始时，医生会先将灌肠软管插入肛门。
2. 放射科医生将水溶性造影剂注入大肠，过程中通过 X 光透视造影观察。
3. 过程中放射科医生会决定为患者经静脉注射能使肌肉放松的药物。
4. 过程中由于气体和水溶性造影剂使大肠膨胀，可能会感到腹部不适。

可能出现的风险及并发症

1. 检查中所用药物引起之副作用
2. 罕见且严重的并发症：
 - 肠穿孔
 - 暂时性菌血症
 - 水溶性造影剂所引致的敏感反应

** 可能出现之风险或并发症未能尽录。患者应明白无论程序如何妥善，仍有出现并发症的风险，并可能需要进行另一手术治疗这些并发症。

检查前的准备

1. 医生会向患者解释检查的原因、过程及可能出现之并发症，患者明白后便须签署同意书。
2. 请告知医生及护士所有以往病史、曾进行过的手术、最近所服用的药物及因药物或麻醉剂而引致的并发症。
3. 现正或怀疑怀孕的女士，请于检查前通知放射科职员。
4. 如患者患有青光眼病，请在检查前告知我们的工作人员。
5. 如患者最近曾进行大肠组织活检，请在抽取组织后最少七天再做此检查。
6. 请携同所有旧片及报告以咨参考。
7. 检查前一天的饮食请以不含脂肪，低纤维食物为主。
8. 将预先收到泻药粉以清理肠胃的排泄物。服泻药粉前3小时内，不可吃任何固体食物。服药粉后，不可吃任何食物，直至完成整个检查。
9. 检查前6小时禁止饮食。
10. 请除去身上所有衣物(如内衣裤、假牙和饰物等)，换上手术衣。
11. 检查前请先排清小便。
12. 如患者为幼儿，请家长替幼儿带备尿不湿及衣服以作替换。

检查后须知

1. 鉴于药物作用可能未完全消退，请勿驾驶或操作重型机械。
2. 可恢复正常活动或遵医嘱恢复活动。

如您对此手术任何疑问或忧虑，请联络主诊医生。

经过医生的悉心诊治，相信您会逐渐康复。

若您阅读此章程后有任何查询，请记下相关问题，以便医生作出跟进。祝阁下顺利安好！

由仁安医院手术室管治委员会编辑

以上资料只供参考，详情请向主诊医生查询
本院保留一切删改此章程之权利，而不作另行通知