



程序資料

水溶性造影劑胃部造影 Water Soluble Contrast Meal

簡介

水溶性造影劑胃部造影是一個放射診斷檢查利用水溶性造影劑(如：Iopamiro, Gastrografin)來為胃部及十二指腸造影，檢查將由放射科醫生以透視造影進行。

適應症

如病人出現下列病徵或有以下疑慮，主診醫生可能會建議病人進行水溶性造影劑胃部造影：

- 檢查未知的胃部穿孔(應用水溶性造影劑)
- 手術後檢查康復進度

檢查過程

1. 檢查開始時，病人會站著或者躺坐在檢查床上。
2. 病人需服下水溶性造影劑，使胃部膨脹，胃壁清楚分開，使造影劑均勻地附在胃壁上。
3. 過程中放射科醫生會要求病人在檢查床上轉身，然後醫生會進行連串 X 光攝影。
4. 過程中水溶性造影劑使腸胃膨脹，病人可能會感到腹部不適。

可能出現的風險及併發症

1. 罕見且嚴重的併發症：
 - 吸入性肺炎
 - 水溶性造影劑所引致的敏感反應

** 可能發生之風險或併發症未能盡錄。病人應明白無論程序如何妥善，仍有發生併發症的風險，並可能需要進行另一手術治療這些併發症。

程序前的預備

1. 醫生會向病人解釋施行程序的原因、過程及可能出現之併發症，病人明白後便可簽署同意書。
2. 請告知醫生及護士所有以往病歷、曾進行過的手術、最近所服用的藥物及因藥物或麻醉而引致的併發症。
3. 現正或懷疑懷孕的女士，請於程序前通知放射科職員。
4. 請攜同所有舊片及報告以諮參考。
5. 程序前 6 小時禁止吸煙。
6. 程序前 6 小時禁止飲食。
7. 請脫下身上衣物(例如內衣、假牙和飾物等)，然後換上手術衣。

程序後須知

1. 檢查後數天請多喝水。
2. 病人可恢復正常活動或遵循主診醫生的指示恢復活動。

如病人對此程序有任何疑問或憂慮，請聯絡醫療造影部。

經過醫生的悉心診治，相信病人會逐漸康復，並祝生活愉快！

若病人閱讀此單張後有任何查詢，請記下相關問題，以便醫生作出跟進。

由仁安醫院手術室管治委員會編輯

以上資料只供參考，詳情請向主診醫生查詢
本院保留一切刪改此單張之權利，而不作另行通知