



检查资料

水溶性造影剂食道造影 Water Soluble Contrast Swallow

简介

水溶性造影剂食道造影是一个放射诊断检查，由放射科医生用水溶性造影剂以透视造影的方式为食道造影。

适应症

如患者出现下列症状或有以下疑虑，主诊医生可能会建议做水溶性造影剂食道造影：

- 吞咽不适或困难
- 因食道肿块或收窄而引起之吞咽困难
- 食道贲门弛缓不能症
- 手术后检查并发症或康复进度

检查过程

1. 过程中患者需服水溶性造影剂，然后医生会进行连串 X 光摄影。

可能出现的风险及并发症

1. 罕见且严重的并发症：
 - 吸入性肺炎
 - 水溶性造影剂所引致的过敏反应

** 可能出现之风险或并发症未能尽录。患者应明白无论检查过程如何妥善，仍有出现并发症的风险，并可能需要进行另一手术治疗这些并发症。

检查前的准备

1. 医生会向患者解释检查的原因、过程及可能出现之并发症，患者明白后便须签署同意书。
2. 请告知医生及护士所有以往病史、曾进行过的手术、最近所服用的药物及因药物或麻醉剂而引致的并发症。
3. 现正或怀疑怀孕的女士，请于检查前通知放射科职员。
4. 请携同所有旧片及报告以咨参考。
5. 请除去身上衣物(如内衣、假牙和饰物等)，换上手术衣。

检查后须知

1. 检查后数天请多喝水。
2. 可恢复正常活动或遵医嘱恢复活动。

如您对此检查任何疑问或忧虑，请联络主诊医生。

经过医生的悉心诊治，相信您会逐渐康复。

若您阅读此章程后有任何查询，请记下相关问题，以便医生作出跟进。祝阁下顺利安好！

由仁安医院手术室管治委员会编辑

以上资料只供参考，详情请向主诊医生查询
本院保留一切删改此章程之权利，而不作另行通知