



## 程序資料

# 靜脈泌尿造影 Intravenous Urography (IVU)

### 簡介

靜脈泌尿造影是一個放射診斷檢查利用造影劑來為泌尿系統造影，檢查將由放射師以 X 光拍攝進行。

### 適應症

如果病人出現下列病徵或有以下疑慮，主診醫生可能會建議病人進行靜脈泌尿造影：

- 檢查泌尿系統，包括腎臟，輸尿管和膀胱
- 找出輸尿管阻塞的位置

### 檢查過程

1. 拍攝完第一張平片後，造影劑將會經靜脈導管注入。
2. 然後會於特定時段進行連串 X 光攝影。
3. 於特定時段有機會在病人的腹部上施加少量壓力，以獲得更清晰的影像。

### 可能出現的風險及併發症

1. 罕見且嚴重的併發症：
  - 刺針滲漏及造影劑所引致的敏感反應

\*\* 可能發生之風險或併發症未能盡錄。病人應明白無論程序如何妥善，仍有發生併發症的風險，並可能需要進行另一手術治療這些併發症。

## 程序前的預備

1. 醫生會向病人解釋施行程序的原因、過程及可能出現之併發症，病人明白後便可簽署同意書。
2. 請告知醫生及護士所有以往病歷、曾進行過的手術、最近所服用的藥物及因藥物或麻醉而引致的併發症。
3. 閣下若對造影劑有敏感，請事先告訴主診醫生，以便於檢查前服用適當藥物。
4. 閣下若患有糖尿病，必須於檢查當天的早上停止服用藥物二甲雙胍，請通知主診醫生於檢查前作出安排。
5. 閣下若患有腎病，請於檢查前通知主診醫生以作安排。
6. 現正或懷疑懷孕的女士，請於程序前通知放射科職員。
7. 請攜同所有舊片及報告以諮參考。
8. 於檢查前一天晚上服食兩粒瀉藥(樂可舒)。
9. 程序前 4 小時禁止飲食。(清水除外)
10. 請脫下身上衣物(例如內衣、假牙和飾物等)，然後換上手術衣。
11. 程序前請先排清小便。

## 程序後須知

1. 檢查後數天請多喝水。
2. 病人可恢復正常活動或遵循主診醫生的指示恢復活動。
3. 閣下若患有糖尿病，必須於檢查其後 48 小時停止服用藥物二甲雙胍。

附件: 接受靜脈注射顯影劑程序須知/ Ref: IL(MEI-01c)

如病人對此程序有任何疑問或憂慮，請聯絡醫療造影部。

經過醫生的悉心診治，相信病人會逐漸康復，並祝生活愉快！

若病人閱讀此單張後有任何查詢，請記下相關問題，以便醫生作出跟進。

---

---

---

由仁安醫院手術室管治委員會編輯

以上資料只供參考，詳情請向主診醫生查詢  
本院保留一切刪改此單張之權利，而不作另行通知