



检查资料

静脉泌尿造影 Intravenous Urography (IVU)

简介

静脉泌尿造影是一个放射诊断检查，由放射师用造影剂以 X 光拍摄的方式为泌尿系统造影。

适应症

如果患者出现下列症状或有以下疑虑，主诊医生可能会建议患者进行静脉泌尿造影：

- 检查泌尿系统，包括肾脏，输尿管和膀胱
- 找出输尿管阻塞的位置

检查过程

1. 拍摄完第一张平片后，经静脉导管注入造影剂。
2. 然后会于特定时段进行连串 X 光摄影。
3. 于特定时段有可能在患者的腹部施加少量压力，以获得更清晰的影像。

可能出现的风险及并发症

1. 罕见且严重的并发症：
 - 刺针渗漏及造影剂所引致的过敏反应

** 可能出现之风险或并发症未能尽录。患者应明白无论过程如何妥善，仍有出现并发症的风险，并可能需要进行另一手术治疗这些并发症。

检查前的准备

1. 医生会向患者解释检查的原因、过程及可能出现之并发症，患者明白后便须签署同意书。
2. 请告知医生及护士所有以往病史、曾进行过的手术、最近所服用的药物及因药物或麻醉剂而引致的并发症。
3. 阁下若对造影剂有过敏，请事先告诉主诊医生，以便于检查前服用适当药物。
4. 阁下若患有糖尿病，必须于检查当天的早上停用药物二甲双胍，请通知主诊医生于检查前作出安排。
5. 阁下若患有肾病，请于检查前通知主诊医生以作安排。
6. 现正或怀疑怀孕的女士，请于检查前通知放射科职员。
7. 请携同所有旧片及报告以咨参考。
8. 检查前一天晚上服食两粒泻药(乐可舒)。
9. 检查前4小时禁止饮食(清水除外)。
10. 请除去身上衣物(如内衣、假牙和饰物等)，换上手术衣。
11. 检查前请先排清小便。

检查后须知

1. 检查后数天请多喝水。
2. 可恢复正常活动或遵医嘱恢复活动。
3. 阁下若患有糖尿病，必须于检查后48小时停用药物二甲双胍。

附件: 接受静脉注射显影剂程序须知/ Ref: IL(MEI-01sc)

如您对此检查任何疑问或忧虑，请联络主诊医生。

经过医生的悉心诊治，相信您会逐渐康复。

若您阅读此章程后有任何查询，请记下相关问题，以便医生作出跟进。祝阁下顺利安好！

由仁安医院手术室管治委员会编辑

以上资料只供参考，详情请向主诊医生查询
本院保留一切删改此章程之权利，而不作另行通知