



程序資料

腸造口造影 Loopogram

簡介

腸造口造影是一個放射診斷檢查利用造影劑來為腸造口及附近位置造影，檢查將由放射科醫生以透視造影進行。

適應症

如果病人出現下列病徵或有以下疑慮，主診醫生可能會建議病人進行腸造口造影：

- 手術後檢查腸造口的功能及是否暢通
- 用於擬定治療計劃

檢查過程

1. 放射科醫生會為病人的造口位置消毒。
2. 在造口置入一條軟導管。
3. 造影劑將會被緩慢地注入造口。
4. 當注入造影劑後，醫生會進行連串 X 光攝影。

可能出現的風險及併發症

1. 罕見且嚴重的併發症：
 - 因意外腸穿孔而造成敗血症或腹膜炎
 - 造影劑所引致的敏感反應

** 可能發生之風險或併發症未能盡錄。病人應明白無論程序如何妥善，仍有發生併發症的風險，並可能需要進行另一手術治療這些併發症。

程序前的預備

1. 醫生會向病人解釋施行程序的原因、過程及可能出現之併發症，病人明白後便可簽署同意書。
2. 請告知醫生及護士所有以往病歷、曾進行過的手術、最近所服用的藥物及因藥物或麻醉而引致的併發症。
3. 現正或懷疑懷孕的女士，請於程序前通知放射科職員。
4. 請攜同所有舊片及報告以諮參考。
5. 程序前 6 小時禁止飲食。
6. 請脫下身上所有衣物(例如內衣褲、假牙和飾物等)，然後換上手術衣。
7. 請攜帶多一個造口袋。
8. 程序前請先排清小便。

程序後須知

1. 檢查後請多喝水。
2. 請遵循主診醫生的指示。

如病人對此程序有任何疑問或憂慮，請聯絡醫療造影部。

經過醫生的悉心診治，相信病人會逐漸康復，並祝生活愉快！

若病人閱讀此單張後有任何查詢，請記下相關問題，以便醫生作出跟進。

由仁安醫院手術室管治委員會編輯

以上資料只供參考，詳情請向主診醫生查詢
本院保留一切刪改此單張之權利，而不作另行通知