



## 检查资料

### 肠造口造影 Loopogram

#### 简介

肠造口造影是一个放射诊断检查，由放射科医生用造影剂以透视造影的方式为肠造口及附近位置造影。

#### 适应症

如果患者出现下列症状或有以下疑虑，主诊医生可能会建议患者进行肠造口造影：

- 手术后检查肠造口的功能及是否畅通
- 用于拟定治疗计划

#### 检查过程

1. 放射科医生会为患者的造口位置消毒。
2. 在造口置入一条软导管。
3. 将造影剂缓慢地注入造口。
4. 当注入造影剂后，医生将进行连串 X 光摄影。

#### 可能出现的风险及并发症

1. 罕见且严重的并发症：
  - 因意外肠穿孔而造成败血症或腹膜炎
  - 造影剂所引致的过敏反应

\*\* 可能出现之风险或并发症未能尽录。患者应明白无论过程如何妥善，仍有出现并发症的风险，并可能需要进行另一手术治疗这些并发症。

## 检查前的准备

1. 医生会向患者解释检查的原因、过程及可能出现之并发症，患者明白后便须签署同意书。
2. 请告知医生及护士所有以往病史、曾进行过的手术、最近所服用的药物及因药物或麻醉剂而引致的并发症。
3. 现正或怀疑怀孕的女士，请于检查前通知放射科职员。
4. 请携同所有旧片及报告以咨参考。
5. 检查前6小时禁止饮食。
6. 请除去身上所有衣物(如内衣裤、假牙和饰物等)，换上手术衣。
7. 请多带一个造口袋。
8. 检查前请先排清小便。

## 检查后须知

1. 检查后请多喝水。
2. 请遵医嘱。

如您对此检查任何疑问或忧虑，请联络主诊医生。

经过医生的悉心诊治，相信您会逐渐康复。

若您阅读此章程后有任何查询，请记下相关问题，以便医生作出跟进。祝阁下顺利安好！

---

---

---

由仁安医院手术室管治委员会编辑

以上资料只供参考，详情请向主诊医生查询  
本院保留一切删改此章程之权利，而不作另行通知