仁安醫院
UNION HOSPITAL

請掃描以下二維碼以獲取電子檔案。

程序資料

脊髓腔造影
Myelogram

簡介

脊髓腔造影是一個放射診斷檢查，由放射科醫生用造影劑以透視造影的方式為脊髓及神經末梢造影。



圖片來源:
https://www.pacificneuroscienceinstitute.org/hydrocephalus/wp-content/uploads/sites/5/2020/02/Myelogram.jpg

適應症

如果病人出現下列病徵或有以下疑慮，主診醫生可能會建議病人進行脊髓腔造影：

- 手術後檢查脊椎現況
- 有椎間盤異常而又無法接受 MRI 檢查
- 用於擬定治療計劃

檢查過程

1. 在檢查開始時，醫生會為病人消毒手術部位皮膚並施行局部麻醉；
2. 其後會利用腰椎穿刺方式，將造影劑注入病人的脊髓腔；
3. 在注射造影劑後，有機會須在床上擺出不同姿勢，以便造影劑流入需要檢查的範圍；
4. 然後，醫生會進行連串 X 光攝影。

可能出現的風險及併發症

1. 罕見的併發症：
   - 頭痛
   - 發紅或噁心
2. 罕見且嚴重的併發症：
   - 神經損傷或椎管神經根周圍出血
   - 腦膜發炎或感染
   - 癲癇發作
   - 水溶性造影劑所引致的敏感反應

** 可能發生之風險或併發症未能盡錄。病人應明白無論程序如何妥善，仍有發生併發症的風險，並可能需要進行另一手術治療這些併發症。

COPYRIGHT UNION HOSPITAL

程序前的預備

1. 醫生會向病人解釋施行程序的原因、過程及可能出現之併發症，病人明白後便可簽署同意書。
2. 請告知醫生及護士所有以往病歷、曾進行過的手術、最近所服用的藥物及因藥物或麻醉而引致的併發症。請準備凝血指數(凝血酶原時間，部分凝血素時間，國際正常比率及血小板)。
3. 現正或懷疑懷孕的女士，請於程序前通知放射科職員。
4. 請攜同所有舊片及報告以諮參考。
5. 請脫下身上所有衣物(例如內衣褲、假牙、和飾物等)，然後換上手術衣。

程序後須知

1. 病人需於復甦區休息一段時間並觀察維生指數及情況。
2. 請多喝水以加快顯影劑從體內排出。
3. 檢查後幾天應避免進行繁重的體力活動或彎腰。
4. 請按照主診醫生的指示。

如病人對此程序有任何疑問或憂慮，請聯絡醫療造影部。

經過醫生的悉心診治，相信病人會逐漸康復，並祝生活愉快！

若病人閱讀此單張後有任何查詢，請記下相關問題，以便醫生作出跟進。

_____

_____

_____

由仁安醫院手術室管治委員會編輯

以上資料只供參考，詳情請向主診醫生查詢
本院保留一切刪改此單張之權利，而不作另行通知

COPYRIGHT UNION HOSPITAL