



程序資料

脊髓腔造影 Myelogram

簡介

脊髓腔造影是一個放射診斷檢查利用造影劑來為脊髓及神經末梢造影，檢查將由放射科醫生以透視造影進行。

適應症

如果病人出現下列病徵或有以下疑慮，主診醫生可能會建議病人進行脊髓腔造影：

- 手術後檢查脊椎現況
- 有椎間盤異常而又無法接受 MRI 檢查
- 用於擬定治療計劃

檢查過程

1. 在檢查開始時，醫生會為病人消毒手術部位皮膚並施行局部麻醉。
2. 其後會利用腰椎穿刺方式，將造影劑注入病人的脊髓腔。
3. 在注射造影劑後，病人有機會須在床上擺出不同姿勢，以便造影劑流入需要被檢查的範圍。
4. 然後醫生會進行連串 X 光攝影。

可能出現的風險及併發症

1. 罕見的併發症：
 - 頭痛
 - 發紅或噁心
2. 罕見且嚴重的併發症：
 - 神經損傷或椎管神經根周圍出血
 - 腦膜發炎或感染
 - 癲癇發作
 - 水溶性造影劑所引致的敏感反應

** 可能發生之風險或併發症未能盡錄。病人應明白無論程序如何妥善，仍有發生併發症的風險，並可能需要進行另一手術治療這些併發症。

程序前的預備

1. 醫生會向病人解釋施行程序的原因、過程及可能出現之併發症，病人明白後便可簽署同意書。
2. 請告知醫生及護士所有以往病歷、曾進行過的手術、最近所服用的藥物及因藥物或麻醉而引致的併發症。請準備凝血指數(凝血酶原時間，部分凝血素時間，國際正常比率及血小板)。
3. 現正或懷疑懷孕的女士，請於程序前通知放射科職員。
4. 如有服用抗血小板藥(Plavix)請於檢查前 5 日停止服用；如有使用低分子量肝素請於檢查前停用一次。
5. 請攜同所有舊片及報告以諮參考。
6. 程序前 6 小時禁止飲食。
7. 請脫下身上衣物(例如內衣、假牙和飾物等)，然後換上手術衣。

程序後須知

1. 病人需於復甦區休息一段時間並被觀察維生指數及情況。
2. 請多喝水以加快顯影劑從體內排出。
3. 檢查後幾天應避免進行繁重的體力活動或彎腰。
4. 請遵循主診醫生的指示。

如病人對此程序有任何疑問或憂慮，請聯絡醫療造影部。

經過醫生的悉心診治，相信病人會逐漸康復，並祝生活愉快！

若病人閱讀此單張後有任何查詢，請記下相關問題，以便醫生作出跟進。

由仁安醫院手術室管治委員會編輯

以上資料只供參考，詳情請向主診醫生查詢
本院保留一切刪改此單張之權利，而不作另行通知