



检查资料

脊髓腔造影 Myelogram


简介

脊髓腔造影是一个放射诊断检查，由放射科医生用造影剂以透视造影的方式为脊髓及神经末梢造影。

适应症

如果患者出现下列症状或有以下疑虑，主治医生可能会建议患者进行脊髓腔造影：

- 手术后检查脊椎现况
- 有椎间盘异常而又无法接受 MRI 检查
- 用于拟定治疗计划



图片来源:

<https://www.pacificneuroscienceinstitute.org/hydrocephalus/wp-content/uploads/sites/5/2020/02/Myelogram.jpg>

检查过程

1. 检查开始时，医生会为患者消毒手术部位皮肤并施行局部麻醉；
2. 其后会利用腰椎穿刺方式，将造影剂注入患者的脊髓腔；
3. 注射造影剂后，有可能须在床上摆出不同姿势，以便造影剂流入需要检查的范围；
4. 然后，医生会拍摄连串的 X 光片。

可能出现的风险及并发症

1. 罕见的并发症：
 - 头疼
 - 发红或恶心
2. 罕见且严重的并发症：
 - 神经损伤或椎管神经根周围出血
 - 脑膜炎或感染
 - 癫痫发作
 - 水溶性造影剂所引致的过敏反应

** 可能出现之风险或并发症未能尽录。患者应明白无论检查过程如何妥善，仍有发生并发症的风险，并可能需要进行另一手术治疗这些并发症。

检查前的准备

1. 医生会向患者解释做此检查的原因、过程及可能出现之并发症，患者明白后便须签署同意书。
2. 请告知医生及护士所有以往病史、曾进行过的手术、最近所服用的药物，及因药物或麻醉剂而引致的并发症。请准备凝血指数(凝血酶原时间，部分凝血素时间，国际正常比率及血小板)。
3. 现正或怀疑怀孕的女士，请于检查前通知放射科职员。
4. 请携带所有旧片及报告以咨参考。
5. 请除去身上所有衣物(如内衣裤、假牙、和饰物等)，换上手术衣。

检查后须知

1. 患者需于复苏区休息一段时间并观察维生指数及情况。
2. 请多喝水以加快显影剂从体内排出。
3. 检查后几天应避免进行繁重的体力活动或弯腰。
4. 请按照主治医生的指示恢复正常活动。

如您对此手术有任何疑问或忧虑，请联络主治医生。

经过医生的悉心治疗，相信您会逐渐康复。

若您阅读此章程后有任何查询，请记住相关问题，以便医生作出跟进。祝阁下顺利安好！

由仁安医院手术室管治委员会编辑

以上资料只供参考，详情请向主诊医生查询
本院保留一切删改此章程之权利，而不作另行通知