



检查资料

逆行性肾盂造影

Retrograde Pyelogram (Unilateral/ Bilateral)

简介

逆行性肾盂造影是一个放射诊断检查，由放射科医生用造影剂以透视造影的方式为泌尿系统造影。

适应症

如果患者出现下列症状或有以下疑虑，主诊医生可能会建议患者做逆行性肾盂造影：

- 检查上泌尿系统
- 找出输尿管的问题
- 检查尿道支架的位置及功能

检查过程

1. 放射科医生会为患者的下阴位置消毒并在尿道置入一条软导管并用小气球固定位置。
2. 经透视造影，将造影剂缓慢地注入输尿管。
3. 医生会进行连串 X 光摄影以检查输尿管及肾盂。

可能出现的风险及并发症

1. 罕见的并发症：
 - 置入导管时尿道或膀胱受损
 - 排尿困难
 - 血尿
 - 尿潴留
 - 导管误入阴道或异位尿道口
2. 罕见且严重的并发症：
 - 感染
 - 水溶性造影剂所引致的过敏反应

** 可能出现之风险或并发症未能尽录。患者应明白无论过程如何妥善，仍有出现并发症的风险，并可能需要进行另一手术治疗这些并发症。

检查前的准备

1. 医生会向患者解释施行程序的原因、过程及可能出现之并发症，患者明白后便须签署同意书。
2. 请告知医生及护士所有以往病史、曾进行过的手术、最近所服用的药物及因药物或麻醉剂而引致的并发症。
3. 现正或怀疑怀孕的女士，请于检查前通知放射科职员。
4. 请携同所有旧片及报告以咨参考。
5. 请除去身上所有衣物(如内衣裤、假牙和饰物等)，换上手术衣。
6. 检查前请先排清小便。
7. 请替幼儿带备尿不湿及衣服以作替换。
8. 如主诊医生有为检查处方药物，请遵医嘱。

检查后须知

1. 检查后数天尿液可能会带轻微粉红色。
2. 检查后数天排尿时可能会有轻微不适。
3. 可以恢复正常活动或遵医嘱。

如您对此检查任何疑问或忧虑，请联络主诊医生。

经过医生的悉心诊治，相信您会逐渐康复。

若您阅读此章程后有任何查询，请记下相关问题，以便医生作出跟进。祝阁下顺利安好！

由仁安医院手术室管治委员会编辑

以上资料只供参考，详情请向主诊医生查询
本院保留一切删改此章程之权利，而不作另行通知