



检查资料

涎管造影

Sialogram (Unilateral/ Bilateral)

简介

涎管造影是一个放射诊断检查，由放射科医生用造影剂以透视造影的方式为唾液腺造影。

本检查不适用于患有急性唾液腺炎的患者。

适应症

如果患者出现下列症状或有以下疑虑，主诊医生可能会建议患者进行涎管造影：

- 唾液腺肿瘤、结石或狭窄
- 唾液腺管道发炎
- 唾液腺腺体发炎

检查过程

1. 患者需躺下，并在未注射造影剂前，拍下平片以检查唾液腺有否不透 X 光射线的结石。
2. 患者须服少量许柠檬汁以刺激唾液分泌。
3. 放射科医生会在患者的唾液腺入口置入一条软导管。
4. 将造影剂缓慢地注入唾液腺系统，医生会进行连串 X 光摄影。

可能出现的风险及并发症

1. 罕见的并发症：
 - 置入导管时使唾液腺受损
 - 唾液腺感染
2. 罕见且严重的并发症：
 - 造影剂所引致的过敏反应

** 可能出现之风险或并发症未能尽录。患者应明白无论过程如何妥善，仍有出现并发症的风险，并可能需要进行另一手术治疗这些并发症。

检查前的准备

1. 医生会向患者解释检查的原因、过程及可能出现之并发症，患者明白后便须签署同意书。
2. 请告知医生及护士所有以往病史、曾进行过的手术、最近所服用的药物及因药物或麻醉剂而引致的并发症。
3. 现正或怀疑怀孕的女士，请于检查前通知放射科职员。
4. 请携同所有旧片及报告以咨参考。
5. 请除去身上衣物(包括假牙和饰物等)，换上手术衣。

检查后须知

1. 可以恢复正常活动或遵医嘱。

如您对此检查任何疑问或忧虑，请联络主诊医生。

经过医生的悉心诊治，相信您会逐渐康复。

若您阅读此章程后有任何查询，请记下相关问题，以便医生作出跟进。祝阁下顺利安好！

由仁安医院手术室管治委员会编辑

以上资料只供参考，详情请向主诊医生查询
本院保留一切删改此章程之权利，而不作另行通知