



程序資料

T 形管膽道造影術 T-Tube Cholangiogram

簡介

T 形管膽道造影術是一個放射診斷檢查利用造影劑來為手術放置的 T 形管位置以及膽管造影，檢查將由放射科醫生以透視造影進行。

適應症

如果病人出現下列病徵或有以下疑慮，主診醫生可能會建議病人進行 T 形管膽道造影術：

- 檢查膽道手術成效
- 檢查膽道是否暢通
- 檢查有否其他併發症

檢查過程

1. 檢查開始時，醫生會先為膽道引流管以及附近位置進行消毒。
2. 造影劑會由放射科醫生經膽道引流管注入膽管系統，過程中會以 X 光透視造影作觀察。
3. 病人可能需轉換不同位置以助拍攝。

可能出現的風險及併發症

1. 罕見的併發症：
 - 出血
2. 罕見且嚴重的併發症：
 - 感染/敗血症
 - 腹膜炎
 - 造影劑所引致的敏感反應

** 可能發生之風險或併發症未能盡錄。病人應明白無論程序如何妥善，仍有發生併發症的風險，並可能需要進行另一手術治療這些併發症。

程序前的預備

1. 醫生會向病人解釋施行程序的原因、過程及可能出現之併發症，病人明白後便可簽署同意書。
2. 請告知醫生及護士所有以往病歷、曾進行過的手術、最近所服用的藥物及因藥物或麻醉而引致的併發症。
3. 現正或懷疑懷孕的女士，請於程序前通知放射科職員。
4. 請攜同所有舊片及報告以諮參考。
5. 請脫下身上衣物(例如內衣、假牙和飾物等)，然後換上手術衣。

程序後須知

1. 避免接觸膽道引流管位置，保持傷口乾爽。
2. 引流袋須放置在低於造口的位置，以免膽汁倒流。

如病人對此程序有任何疑問或憂慮，請聯絡醫療造影部。

經過醫生的悉心診治，相信病人會逐漸康復，並祝生活愉快！

若病人閱讀此單張後有任何查詢，請記下相關問題，以便醫生作出跟進。

由仁安醫院手術室管治委員會編輯

以上資料只供參考，詳情請向主診醫生查詢
本院保留一切刪改此單張之權利，而不作另行通知