



## 治疗资料

# 药物引产 Drug Induced Abortion

### 简介

药物引产是使用药物终止怀孕，所使用的药物会刺激子宫收缩及子宫颈扩张，从而将子宫内的怀孕组织排出。此程序可在妇女怀孕 23 周内进行。

### 适应症

1. 继续怀孕对孕妇的身体或心理健康有害
2. 胎儿异常

### 预期效果

能用药物将怀孕组织排出体外，终止怀孕。

### 治疗过程

1. 定时服用医生处方的药物(口服药物或阴道栓剂)；
2. 每次如厕时，使用医护人员提供的容器，以便护士检查妊娠组织有否同时排出；
3. 会出现阴道出血及腹部绞痛，此情况会持续数小时；
4. 当开始感到腹部绞痛，便需停止饮食；
5. 有需要时会提供止痛药物；
6. 怀孕组织从阴道排出体外；
7. 若胎儿或胎盘未能完全排出，可能需要进行手术取出残余组织。

### 可能出现的风险及并发症

1. 大量出血。
2. 宫颈内口松弛。
3. 宫腔粘连。
4. 流产程序失效。
5. 未能完全流产。
6. 妊娠物残留而导致出血或感染，需进行刮宫手术。
7. 盆腔感染，可能影响生育能力。
8. 因子宫破裂而需进行外科手术修补子宫，甚或将子宫切除(罕见)。
9. 药物副作用包括恶心、呕吐、腹泻、发烧及过敏等。
10. 将来可能有第三产程并发症。
11. 不良的心理影响。

\*\* 可能出现之风险或并发症未能尽录。患者应明白无论程序如何妥善，仍有出现并发症的风险。

## 治疗前的准备

1. 医生会向患者解释手术的原因、过程及可能出现之并发症，患者明白后便须签署同意书。
2. 请告知医生及护士所有以往病史、曾进行过的手术、最近所服用的药物，及因药物或麻醉剂而引致的并发症。如正服用影响血液凝固的药物，例如阿斯匹林(Aspirin)、华法林(Warfarin)、拜瑞妥(Xarelto)或百达生(Pradaxa)，请尽早通知医生。
3. 如有需要，医护人员会安排患者于术前进行血液测试、人类绒毛膜促性腺激素血液测试、超声波检查及盆腔检查。
4. 建议患者使用卫生巾。
5. 若使用阴道栓剂，塞药后需卧床半小时以上，以免药物流出。
6. 请除去身上所有个人物品(如内衣、假牙、饰物和隐形眼镜等)，换上手术衣。
7. 每次用药前请先排清小便。

## 治疗后须知

终止怀孕过程可能会超过一天，患者未必可以即日出院。

## 出院后注意事项

1. 数天内:
  - 或会感到乳房胀痛，可穿戴承托力较强的文胸、在乳房上敷冰垫及服用处方的止痛药皆可舒缓不适感。
  - 避免剧烈活动或运动。
2. 两星期内会有阴道出血及轻微腹痛现象。有需要时，可服医生处方之止痛药。暖敷下腹可减轻疼痛。
3. 两至三星期内，请勿有性生活，直至阴道停止出血为止。
4. 请多休息。
5. 为降低感染风险，请勿使用卫生棉条直至下一次月经来临。
6. 月经周期会在四至六星期后恢复正常。
7. 流产后可以很快再次怀孕，甚至早于下一次月经来临。请与医生或护士商讨合适的避孕方法，尤其在流产后首月应避免再次怀孕。
8. 如出现腹部或背部疼痛、阴道大量出血或流出恶臭分泌物、寒颤、发烧(体温高达 38°C 或以上)或其他异常情况，请即联络主诊医生或回院治疗。
9. 请于两星期后或指定日期、时间及地点复诊。

如您对此手术有任何疑问或忧虑，请联络主诊医生。

经过医生的悉心诊治，相信您会逐渐康复。

若您阅读此章程后有任何查询，请记住相关问题，以便医生作出跟进。祝阁下顺利安好！

---

---

---

由仁安医院手术室管治委员会编辑

以上资料只供参考，详情请向主诊医生查询  
本院保留一切删改此章程之权利，而不作另行通知

