

程序資料

子宮內膜活組織檢查 Endometrial Biopsy

簡介

子宮內膜活組織檢查會從子宮內膜切除一小塊組織，此程序可以幫助診斷因異常組織或荷爾蒙水平變化而引起的細胞病變。

檢查成效

取出之少量活組織樣本會送往病理部在顯微鏡下分析以診斷病症，有助於找出子宮異常出血的原因、篩查子宮內膜癌，評估生育能力並測試對荷爾蒙治療的反應。

檢查過程

1. 此檢查可在局部或毋需麻醉下進行；
2. 把婦科用的鴨咀鉗輕輕地張開陰道，露出子宮頸；
3. 把膠抽吸管經子宮頸放進子宮內，抽取少量子宮內膜組織；
4. 把取出之活組織樣本送往病理部診斷；
5. 把幼小膠導管放入子宮時可能會出現短暫性的抽搐痛，檢查期間或檢查後若有輕微不適均屬常見現象，不適可持續數小時。

禁忌症

1. 懷孕
2. 急性盆腔炎
3. 凝血功能障礙
4. 急性宮腔或陰道感染
5. 宮頸癌

可能出現的風險及併發症

1. 陰道出血
2. 子宮或輸卵管感染(罕有)
3. 子宮穿孔(罕有)

** 可能出現之風險或併發症未能盡錄。病人應明白無論程序如何妥善，仍有出現併發症的風險。

檢查前的預備

1. 保持個人衛生可預防感染。
2. 醫生會向病人解釋施行檢查的原因、過程及可能出現之併發症，病人明白後便可簽署同意書。
3. 請告知醫生及護士所有以往病歷、曾進行過的手術、最近所服用的藥物及因藥物或麻醉而引致的併發症。
4. 懷孕的病人不可進行此項檢查，已懷孕或懷疑懷孕的女士需預先通知醫生。

5. 檢查前兩天，請避免使用任何經陰道溶解的藥物或塗搽藥膏，並避免進行陰道灌洗。

檢查後須知

在正常情況下，病人可同日出院。

出院後注意事項

1. 數天內可能會出現少量陰道出血或點狀出血亦屬正常現象。
2. 如有需要，按醫生處方服用以下藥物：
 - 止痛藥: 舒緩子宮痙攣
 - 抗生素: 預防感染
 - 荷爾蒙: 因荷爾蒙水平改變而引致子宮異常出血
3. 請避免性生活直至陰道出血停止。
4. 如大量陰道出血、流出惡臭分泌物、寒顫、發熱(體溫高達38°C或100°F以上)或其他異常情況等，請即聯絡主診醫生或回院診治。
5. 請於指定日期、時間及地點覆診。

如病人對此檢查有任何疑問或憂慮，請聯絡主診醫生。

經過醫生的悉心診治，相信病人會逐漸康復，並祝生活愉快！

若病人閱讀此單張後有任何查詢，請記下相關問題，以便醫生作出跟進。

由仁安醫院手術室管治委員會編輯

以上資料只供參考，詳情請向主診醫生查詢
本院保留一切刪改此單張之權利，而不作另行通知