



## 检查资料


### 子宫内膜活组织检查 Endometrial Biopsy

#### 简介

子宫内膜活组织检查是从子宫内膜切除一小块组织，可以帮助诊断因异常组织或荷尔蒙水平变化而引起的细胞病变。

#### 检查效果

取出的少量活组织样本会送往病理部分分析及诊断，有助于找出子宫异常出血的原因、筛查子宫内膜癌，评估生育能力并测试对荷尔蒙治疗的反应。



图片来源：  
<https://www.indoreinfertilityclinic.com/wp-content/uploads/2013/07/Endometrial-Biopsy.jpg>

#### 检查过程

1. 此检查可在局部或毋需麻醉下进行；
2. 用妇科用的扩张器扩张阴道，露出子宫颈；
3. 将抽吸管经子宫颈放进子宫内，抽取少量子宫内膜组织；
4. 把取出的活组织样本送到病理部检验及诊断；
5. 导管放入子宫时可能会出现短暂性的抽搐痛，检查期间或检查后若有轻微不适均属常见现象，不适可能持续数小时。

#### 禁忌症

1. 怀孕
2. 急性盆腔炎
3. 凝血功能障碍
4. 急性宫腔或阴道感染
5. 子宫颈癌

## 可能出现的风险及并发症

1. 阴道出血
2. 子宫或输卵管感染(罕有)
3. 子宫穿孔(罕有)

\*\* 可能出现之风险或并发症未能尽录。患者应明白无论检查过程如何妥善，仍有出现并发症的风险。

## 检查前的准备

1. 保持个人卫生可预防感染。
2. 医生会向患者解释检查的原因、过程及可能出现之并发症，患者明白后便须签署同意书。
3. 请告知医生及护士所有以往病史、曾进行过的手术、最近所服用的药物及因药物或麻醉剂而引致的并发症。
4. 怀孕的患者不可做此项检查，已怀孕或怀疑怀孕的女士请提前通知医生。
5. 检查前两天，请勿使用任何经阴道溶解的药物或药膏，并避免进行阴道灌洗。

## 检查后须知

正常情况下，患者可当天出院。

## 出院后注意事项

1. 数天内可能会出现少量阴道出血或点状出血，属正常现象。
2. 如有需要，按医生处方服用以下药物：
  - 止痛药: 缓解子宫痉挛
  - 抗生素: 预防感染
  - 荷尔蒙: 因荷尔蒙水平改变而引致子宫异常出血
3. 请勿进行性生活直至阴道出血停止。
4. 如阴道大量出血、流出恶臭分泌物、寒颤、发烧(体温高达38°C或以上)或其他异常情况，请即联络主诊医生或回院治疗。
5. 请按时复诊。

如您对此手术有任何疑问或忧虑，请联络主诊医生。

经过医生的悉心治疗，相信您会逐渐康复。

若您阅读此章程后有任何查询，请记下相关问题，以便医生作出跟进。祝阁下顺利安好！

---

---

---

由仁安医院手术室管治委员会编辑

以上资料只供参考，详情请向主诊医生查询  
本院保留一切删改此章程之权利，而不作另行通知

