



程序資料

關節積液抽吸術 Aspiration of Joint Fluid

簡介

關節積液抽吸術是一項利用抽吸器除去關節積液的程序，抽出的積液會被送往病理部作種菌培養及化學測試。

治療成效

此程序有助治療關節腫痛及診斷關節炎的成因，例如感染、痛風及類風濕。此外，也可減低因患處積液而造成的疼痛。

程序過程

1. 程序會在局部麻醉下進行；
2. 使用消毒液清洗患處；
3. 把附有針頭的注射器放入關節抽吸積液；
4. 取出針頭，以防水敷料覆蓋抽吸處；
5. 抽出的積液會送往病理部化驗。


可能出現的風險及併發症

1. 局部瘀傷
2. 少量傷口出血，附近位置可能瘀腫
3. 感染性關節炎(罕有)

** 可能出現之風險或併發症未能盡錄。病人應明白無論程序如何妥善，仍有出現併發症的風險。

程序前的預備

1. 保持個人衛生可預防感染。
2. 醫生會向病人解釋施行程序的原因、過程及可能出現之併發症，病人明白後便可簽署同意書。
3. 請告知醫生及護士所有以往病歷、曾進行過的手術、最近所服用的藥物及因藥物或麻醉而引致的併發症。如正服用影響血液凝固的藥物，例如阿士匹靈(Aspirin)、華法林(Warfarin)、拜瑞妥(Xarelto)或百達生(Pradaxa)或非類固醇抗炎藥，例如布洛芬(Ibuprofen)、萘普生(Naproxen)及中藥，請儘早通知醫生。
4. 已懷孕或懷疑懷孕的女士需預先通知醫生。



圖片來源:

https://media.springernature.com/lw685/springer-static/image/chp%3A10.1007%2F978-3-030-85047-0_115/MediaObjects/209926_2_En_115_Fig1_HTML.jpg

程序後須知

1. 應保持抽吸處清潔及乾爽，並按醫生指示除去敷料。
2. 程序後可能會有輕微出血及不適，如有需要，可服用醫生處方之止痛藥。

出院後注意事項

1. 程序後的數天內可能會感到關節痛、不適或患處出現瘀傷，此乃正常現象，並會在隨後逐漸消退。
2. 按醫生指示冰敷，能有效減低疼痛及關節腫脹。
3. 如抽吸處異常疼痛、發紅及腫大、出血或流出分泌物、寒顫、發熱(體溫高達 38°C 或 100.4°F 以上)或其他異常情況等，請即聯絡主診醫生或回院診治。
4. 康復初期可使用拐杖助行。
5. 請於指定日期、時間及地點覆診。

如病人對此程序有任何疑問或憂慮，請聯絡主診醫生。

經過醫生的悉心診治，相信病人會逐漸康復，並祝生活愉快！

若病人閱讀此單張後有任何查詢，請記下相關問題，以便醫生作出跟進。

由仁安醫院手術室管治委員會編輯

以上資料只供參考，詳情請向主診醫生查詢
本院保留一切刪改此單張之權利，而不作另行通知