

## 手术资料

### 关节积液抽取术 Aspiration of Joint Fluid

#### 简介

关节积液抽取术是一项利用抽吸器除去关节积液的程序，抽出之积液会被送往病理部作细菌培养及化学测试。

#### 治疗效果

有助治疗关节肿痛及诊断关节炎的成因，例如感染、痛风及类风湿。此外，也可减低因患处积液而造成的疼痛。

#### 过程

1. 在局部麻醉下进行；
2. 使用消毒液清洗患处；
3. 把附有针头的注射器插入关节抽积液；
4. 取出针头，用防水敷料覆盖针眼处；
5. 抽出的积液会被送往病理部检验。

#### 可能出现的风险及并发症

1. 局部瘀伤
2. 少量出血
3. 感染性关节炎(罕有)
4. 针眼处结晶、皮肤收缩或脱色、血糖上升及感染恶化(如需使用类固醇药物)
5. 体重增加、面部及身体浮肿、容易撞瘀(如过密使用类固醇药物)
6. 患处关节局部发炎及肿胀(如需注射透明质酸提取物)

\*\* 可能出现之风险或并发症未能尽录。患者应明白无论手术如何妥善，仍有出现并发症的风险。

#### 术前的准备

1. 保持个人卫生可预防感染。
2. 医生会向患者解释施行手术的原因、过程及可能出现之并发症，患者明白后便须签署同意书。
3. 请告知医生及护士所有以往病史、曾进行过的手术、最近所服用的药物及因药物或麻醉剂而引致的并发症。如正服用影响血液凝固的药物，例如阿斯匹林(Aspirin)、华法林(Warfarin)、拜瑞妥(Xarelto)或 Pradaxa(百达生)及中药，请尽早通知医生。
4. 已怀孕或怀疑怀孕的女士需预先通知医生。

## 术后须知

1. 应保持针眼处清洁干燥，并按医生指示揭掉敷料。
2. 术后可能会有轻微出血及不适，如有需要，可服医生处方止痛药。

## 出院后注意事项

1. 术后的数天内可能会感到关节痛、不适或患处出现瘀伤，此为正常现象，并会在随后逐渐消退。
2. 按医生指示冷敷，能有效减低疼痛及关节肿胀。
3. 如针眼处异常疼痛、发红及肿大、出血或流出分泌物、寒颤、发烧(体温高达 38°C 或以上)或其他异常情况，请即联络主诊医生或回院治疗。
4. 康复初期可使用拐杖帮助行动。
5. 请按时复诊。

如您对此手术有任何疑问或忧虑，请联络主诊医生。

经过医生的悉心诊治，相信您会逐渐康复。

若您阅读此章程后有任何查询，请记下相关问题，以便医生作出跟进。祝阁下顺利安好！

---

---

---

由仁安医院手术室管治委员会编辑

以上资料只供参考，详情请向主诊医生查询  
本院保留一切删改此章程之权利，而不作另行通知