



程序資料

閉合性復位術 Closed Reduction

簡介

閉合性復位術是指在不需進行開刀手術的情況下將骨折部位復位。當病人出現骨折或脫臼時，碎骨會因移位或角度問題引致偏離原來位置。為了使傷口癒合及避免出現畸形，必須將碎骨重新矯正。

治療成效

此程序可將骨折部位重新矯正至正確位置及預防因骨折帶來的進一步損傷、感染及併發症。程序後，受傷部位的功能及靈活性將可恢復正常。


程序過程

1. 程序可在局部麻醉或鎮靜下進行；
2. 醫生將推動或拉動骨骼使骨骼重新定位；
3. 定位後進行 X 光檢查；
4. 用石膏或夾板固定。

可能出現的風險及併發症

1. 疼痛和腫脹
2. 附近神經、血管和其他軟組織受損
3. 新骨折
4. 血栓形成
5. 復位失敗

** 可能出現之風險或併發症未能盡錄。病人應明白無論程序如何妥善，仍有出現併發症的風險。如附近器官受損、手術後嚴重出血或滲漏時，可能需要進行另一手術治療這些併發症。



圖片來源：

<https://images.fineartamerica.com/images-medium-large-5/1-fracture-reduction-jeanette-engqvist.jpg>

程序前的預備

1. 醫生會向病人解釋施行程序的原因、程序及可能出現之併發症，病人明白後便可簽署同意書。
2. 請告知醫生及護士所有以往病歷、曾進行過的手術、最近所服用的藥物及因藥物或麻醉而引致的併發症。如正服用影響血液凝固的藥物，例如阿士匹靈(Aspirin)、華法林(Warfarin)、拜瑞妥(Xarelto)或百達生(Pradaxa)或非類固醇抗炎藥，例如布洛芬(Ibuprofen)、萘普生(Naproxen)及中藥，請儘早通知醫生。
3. 如有需要，程序前會進行 X 光造影檢查。
4. 請脫下身上所有衣物(例如內衣褲、假牙、飾物和隱形眼鏡等)，然後換上手術衣。
5. 程序前請先排清小便。

程序後需知

1. 程序完成數小時後，便可出院。
2. 請按照醫生指示恢復正常飲食。
3. 程序後數週內，請勿提取重物及進行劇烈及競技運動。

如患肢敷上石膏，請注意以下事項：

1. 石膏表面乾透需約二至三小時：
 - 請勿將打上石膏的患肢放在硬物上
 - 請勿移動在石膏內的關節
 - 請勿壓打石膏患肢
2. 石膏需時一至二天才完全乾透。當石膏完全乾透後，
 - 請勿弄濕石膏以防止變形
 - 可使用三角巾手掛或枕頭盡量將患肢保持於心臟的水平位置，可幫助血液循環及減少腫脹
 - 請勿將液體或硬物滑入石膏內部，或自行修剪石膏
 - 其他並無受傷的關節應定時活動，以保持非患肢的關節靈活性

出院後注意事項

1. 請按照醫生指示服用藥物。
2. 如患肢出現劇烈疼痛、嚴重麻木和刺痛、寒顫、發熱(體溫高達 38°C 或 100.4°F 以上) 或其他異常情況等，請即聯絡主診醫生或回院診治。
3. 請於指定日期、時間及地點覆診。

如病人對此程序有任何疑問或憂慮，請聯絡主診醫生。

經過醫生的悉心診治，相信病人會逐漸康復，並祝生活愉快！

若病人閱讀此單張後有任何查詢，請記下相關問題，以便醫生作出跟進。

由仁安醫院手術室管治委員會編輯

以上資料只供參考，詳情請向主診醫生查詢
本院保留一切刪改此單張之權利，而不作另行通知

