

手术资料

闭合性复位术 Closed Reduction

简介

闭合性复位术是指在不需手术的情况下将骨折部位复位。当患者出现骨折或脱臼时，碎骨会因移位或角度问题引致偏离原来位置。为了使伤口愈合及避免出现畸形，必须将碎骨重新矫正。

治疗效果

手术可将骨折部位重新矫正到正确位置及预防因骨折带来的进一步损伤、感染及并发症。术后，受伤部位的功能及灵活性可恢复正常。

手术过程

1. 手术在局部麻醉或注射镇静剂下进行；
2. 医生将推动或拉动骨骼使骨骼重新定位；
3. 定位后再进行 X 光检查；
4. 用石膏或夹板固定。

可能出现的风险及并发症

1. 疼痛和肿胀
2. 附近神经、血管和其他软组织受损
3. 新骨折
4. 血栓形成
5. 复位失败

** 可能出现之风险或并发症未能尽录。患者应明白无论手术如何妥善，仍有出现并发症的风险。如附近器官受损、手术后严重出血或渗漏时，可能需要进行另一手术治疗这些并发症。

手术前的准备

1. 医生会向患者解释施行手术的原因、过程及可能出现之并发症，患者明白后便须签署同意书。
2. 请告知医生及护士所有以往病史、曾进行过的手术、最近所服用的药物及因药物或麻醉剂而引致的并发症。
3. 如有需要，手术前需进行 X 光造影检查。
4. 请除去身上所有衣物(如内衣裤、假牙、饰物和隐形眼镜等)，换上手术衣。
5. 手术前请先排清小便。

手术后需知

1. 手术完成数小时后，便可出院。
2. 请依照医生指示恢复正常饮食。
3. 手术后数周内，请勿提重物及做剧烈及竞技运动。

如患肢打上石膏，请注意以下事项：

1. 石膏表面干透约需二至三小时：
 - 请勿将打石膏的患肢放在硬物上
 - 请勿移动在石膏内的关节
 - 请勿压打石膏的患肢
2. 石膏需一至二天才完全干透。当石膏完全干透后：
 - 请勿弄湿石膏以防变形
 - 可使用三角巾手挂或枕头尽量将患肢保持于心脏的水平位置，可帮助血液循环及减少肿胀
 - 请勿将液体或硬物滑入石膏内部，或自行修剪石膏
 - 其他并无受伤的关节应定时活动，以保持非患肢的关节靈活性

出院后注意事项

1. 请遵照医生指示服用药物。
2. 如出现剧烈疼痛、严重麻木和刺痛、寒颤、发烧(体温高达 38°C 或以上) 或其他异常情况，请即联络主诊医生或回院治疗。
3. 请按时复诊。

如您对此手术有任何疑问或忧虑，请联络主诊医生。

经过医生的悉心诊治，相信您会逐渐康复。

若您阅读此章程后有任何查询，请记住相关问题，以便医生作出跟进。祝阁下顺利安好！

由仁安医院手术室管治委员会编辑

以上资料只供参考，详情请向主诊医生查询
本院保留一切删改此章程之权利，而不作另行通知