



程序资料

闭合性复位术 Closed Reduction

简介

闭合性复位术是指在不需开刀手术的情况下将骨折部位复位。当患者出现骨折或脱臼时，碎骨会因移位或角度问题引致偏离原来位置。为了使伤口愈合及避免出现畸形，必须将碎骨重新矫正。

治疗效果

可将骨折部位重新矫正至正确位置及预防因骨折带来的进一步损伤、感染及并发症。程序后，受伤部位的功能及灵活性将可恢复正常。


程序过程

1. 可在局部麻醉或镇静剂下进行；
2. 医生将推动或拉动骨骼使骨骼重新定位；
3. 定位后进行 X 光检查；
4. 用石膏或夹板固定。

可能出现的风险及并发症

1. 疼痛和肿胀
2. 附近神经、血管和其他软组织受损
3. 新骨折
4. 血栓形成
5. 复位失败

** 可能出现之风险或并发症未能尽录。患者应明白无论程序如何妥善，仍有出现并发症的风险。如附近器官受损、手术后严重出血或渗漏时，可能需要进行另一手术治疗这些并发症。



图片来源：

<https://images.fineartamerica.com/images-medium-large-5/1-fracture-reduction-jeanette-engagevist.jpg>

程序前的准备

1. 医生会向患者解释手术的原因、过程及可能出现之并发症，患者明白后便须签署同意书。
2. 请告知医生及护士所有以往病史、曾进行过的手术、最近所服用的药物及因药物或麻醉剂而引致的并发症。如正服用影响血液凝固的药物，例如阿斯匹林(Aspirin)、华法林(Warfarin)、拜瑞妥(Xarelto)或百达生(Pradaxa)或非类固醇抗炎药，例如布洛芬(Ibuprofen)、萘普生(Naproxen)及中药，请尽早通知医生。
3. 如有需要，程序前会进行 X 光造影检查。
4. 请除去身上所有衣物(如内衣裤、假牙、饰物和隐形眼镜等)，换上手术衣。
5. 程序前请先排清小便。

程序后需知

1. 程序完成数小时后，便可出院。
2. 请按照医生指示恢复正常饮食。
3. 程序后数周内，请勿提重物及进行剧烈及竞技运动。

如患肢打上石膏，请注意以下事项：

1. 石膏表面干透需约二至三小时：
 - 请勿将打上石膏的患肢放在硬物上
 - 请勿移动石膏内的关节
 - 请勿压打石膏患肢
2. 石膏需时一至二天才完全干透。石膏完全干透后，
 - 请勿弄湿石膏以防止变形
 - 可使用三角巾手挂或枕头尽量将患肢保持于心脏的水平位置，可帮助血液循环及减少肿胀
 - 请勿使液体或硬物滑入石膏内部，或自己修剪石膏
 - 其他并无受伤的关节应定时活动，以保持非患肢的关节灵活性

出院后注意事项

1. 请按照医生指示服药。
2. 如患肢出现剧烈疼痛、严重麻木和刺痛、寒颤、发烧(体温高达 38°C 或以上) 或其他异常情况，请即联络主诊医生或回院治疗。
3. 请按时复诊。

如您对此手术有任何疑问或忧虑，请联络主诊医生。

经过医生的悉心治疗，相信您会逐渐康复，并祝生活愉快！

若您阅读此章程后有任何查询，请记下相关问题，以便医生作出跟进。祝阁下顺利安好！

由仁安医院手术室管治委员会编辑

以上资料只供参考，详情请向主诊医生查询
本院保留一切删改此章程之权利，而不作另行通知

