



手術資料

陰莖下曲矯正術 Correction of Chordee

簡介

尿道纖維黏連是陰莖的一種先天性發育異常缺陷，當勃起時，陰莖頭會向下彎曲。陰莖下曲矯正術是通過手術使彎曲的陰莖恢復挺直。

若陰莖彎曲的角度超過 30 度，便需在出生六個月後進行矯正手術。陰莖彎曲的角度超過 60 度會影響日後的性功能。

治療成效

此手術可顯著幫助矯正尿線角度，令患兒成長後可用正常站立方式小便。此外，陰莖勃起時亦不會感到疼痛，更可改善陰莖外觀。

手術過程

1. 手術會在全身麻醉下進行；
2. 剝開包皮，然後矯正彎曲的部分；
3. 把陰莖背側較長的皮膚覆蓋腹側的一面；
4. 放入導尿管以排清尿液；
5. 包紮陰莖周圍。

可能出現的風險及併發症

1. 感染
2. 出血
3. 腫脹
4. 排尿困難

** 可能出現之風險或併發症未能盡錄。家長/病人應明白無論手術如何妥善，仍有出現併發症的風險。如附近器官受損、手術後嚴重出血或滲漏時，可能需要進行另一手術治療這些併發症。

手術前的預備

病人必需遵照以下指引，否則可能會延誤或取消手術。

1. 保持個人衛生可預防傷口感染。
2. 醫生會向家長/病人解釋施行手術的原因、程序及可能出現之併發症，家長/病人明白後便可簽署同意書。
3. 請告知醫生及護士所有以往病歷、曾進行過的手術、最近所服用的藥物及因藥物或麻醉而引致的併發症。
4. 麻醉科醫生亦會與家長及病人會面，解釋麻醉的風險及術後須知。
5. 手術前會進行常規檢查。
6. 術前 6 小時禁止飲食。
7. 請脫下身上所有衣物(例如內衣褲、假牙、飾物和隱形眼鏡等)，然後換上手術衣。
8. 手術前請先排清小便。

手術後須知

一般情況

1. 全身麻醉後，病人可能會:
 - 因麻醉時曾插喉而引致喉部輕微不適或疼痛；
 - 出現麻醉藥的副作用，包括疲倦、渴睡、噁心或嘔吐，如情況持續或加劇，請通知護士。
2. 腫脹是正常現象，可使用醫生處方的消炎藥膏以減輕腫脹及痛楚。
3. 請保持敷料清潔乾爽及按指示保護敷料。
4. 導尿管通常會在 2-3 天後拔除。

飲食

待麻醉藥效消退後，便可按指示恢復正常飲食。

出院後注意事項

1. 如有需要，可服用醫生處方之止痛藥。
2. 陰莖康復期間，病人只可進行少量及輕量的活動。
3. 如傷口部位出現紅腫、腫脹、觸痛、滲膿或出血、腹痛或嘔吐、寒顫、發熱(體溫達 38°C 或 100.4°F 以上)或其他異常情況等，請即聯絡主診醫生或回院診治。
4. 請於指定日期、時間及地點覆診。

如病人/家長對此手術有任何疑問或憂慮，請聯絡主診醫生。

經過醫生的悉心診治，相信病人會逐漸康復，並祝生活愉快！

若病人/家長閱讀此單張後有任何查詢，請記下相關問題，以便醫生作出跟進。

由仁安醫院手術室管治委員會編輯

以上資料只供參考，詳情請向主診醫生查詢
本院保留一切刪改此單張之權利，而不作另行通知

