



手术资料

阴茎下曲矫正术 Correction of Chordee

简介

尿道纤维黏连是阴茎的一种先天性发育异常缺陷，当勃起时，阴茎头会向下弯曲。阴茎下曲矫正术是通过手术使弯曲的阴茎恢复挺直。

若阴茎弯曲的角度超过 30 度，便需在出生六个月后进行矫正手术。阴茎弯曲的角度超过 60 度会影响日后的性功能。

治疗效果

手术可显著帮助矫正尿线角度，使患儿成长后可用正常站立方式姿势小便，阴茎勃起时也不会感到疼痛，更可改善阴茎外观。

手术过程

1. 手术会在全身麻醉下进行；
2. 剥开包皮，矫正弯曲的部分；
3. 把阴茎背侧较长的皮肤覆盖腹侧的一面；
4. 放入导尿管排尿；
5. 包扎阴茎周围。

可能出现的风险及并发症

1. 感染
2. 出血
3. 肿胀
4. 排尿困难

** 可能出现之风险或并发症未能尽录。家长/患者应明白无论手术如何妥善，仍有出现并发症的风险。如附近器官受损、手术后严重出血或渗漏时，可能需要进行另一手术治疗这些并发症。

手术前的准备

患者必需遵照以下指引，否则可能会延误或取消手术。

1. 保持个人卫生可预防伤口感染。
2. 医生会向家长/患者解释手术的原因、过程及可能出现之并发症，家长/患者明白后便须签署同意书。
3. 请告知医生及护士所有以往病史、曾进行过的手术、最近所服用的药物及因药物或麻醉剂而引致的并发症。
4. 麻醉科医生会与家长及患者会面，解释麻醉的风险及术后须知。
5. 手术前会进行常规检查。
6. 术前6小时禁止饮食。
7. 请除去身上所有衣物(如内衣裤、假牙、饰物和隐形眼镜等)，换上手术衣。
8. 手术前请先排清小便。

手术后须知

一般情况

1. 全身麻醉后，患者可能会：
 - 因麻醉时曾插管而引致喉部轻微不适或疼痛；
 - 出现麻醉药的副作用，包括疲倦、渴睡、恶心或呕吐，如情况持续或加剧，请通知护士。
2. 肿胀是正常现象，可使用医生处方的消炎药膏减轻肿胀及疼痛。
3. 请保持敷料清洁干燥及按指示保护敷料。
4. 导尿管通常会在2-3天后拔除。

饮食

麻醉药作用消退后，便可按指示恢复正常饮食。

出院后注意事项

1. 如有需要，可服医生处方止痛药。
2. 阴茎康复期间，患者只可进行少量及轻量的活动。
3. 如伤口部位出现红肿、肿胀、触痛、渗脓或出血、腹痛或呕吐、寒颤、发烧(体温达 38°C 或以上)或其他异常情况，请即联络主诊医生或回院治疗。
4. 请按时复诊。

如家长或监护人对此手术有任何疑问或忧虑，请联络主诊医生。

经过医生的悉心诊治，相信患儿会逐渐康复。

若阅读此章程后有任何查询，请记下相关问题，以便医生作出跟进。祝阁下顺利安好！

由仁安医院手术室管治委员会编辑

以上资料只供参考，详情请向主诊医生查询
本院保留一切删改此章程之权利，而不作另行通知

