



## 手术资料

### 耻骨上膀胱导尿管插入术(只适用于儿童) Suprapubic Catheterization (Paediatrics only)

#### 简介

耻骨上膀胱导尿管插入术是把导尿管经下腹壁切口放入膀胱内，如有需要，会进行膀胱镜检查以助插入耻骨上导尿管。手术会以无菌技术并在全身麻醉下进行，也可作为儿童尿路动态机能检查前的准备。

#### 治疗效果

手术可显著帮助缓解因以下情况而引起的尿潴留：

- 尿道损伤
- 尿道阻塞
- 膀胱颈包块

#### 手术过程

1. 手术会在全身麻醉下进行；
2. 膀胱充水胀满后，经下腹小切口放入耻骨上膀胱导尿管；
3. 用仪器经尿道观察膀胱以矫正导尿管的摆放位置；
4. 缝合并用缝线固定导尿管。

#### 可能出现的风险及并发症

1. 感染
2. 出血，需要进行灌洗或放入另外的导尿管移除血块，堵塞的导尿管需进行开通
3. 膀胱不适或疼痛
4. 导尿管或其缝线脱落

\*\* 可能出现之风险或并发症未能尽录。家长/患儿应明白无论手术如何妥善，仍有出现并发症的风险。如附近器官受损、手术后严重出血或渗漏时，可能需要进行另一手术治疗这些并发症。

## 手术前的准备

患儿必需遵照以下指引，否则可能会延误或取消手术。

1. 保持个人卫生可预防伤口感染。
2. 医生会向家长/患儿解释手术的原因、过程及可能出现之并发症，家长/患儿明白后便须签署同意书。
3. 请告知医生及护士所有以往病史、曾进行过的手术、最近所服用的药物及因药物或麻醉剂而引致的并发症。
4. 麻醉科医生会与家长及患儿会面，解释麻醉的风险及术后须知。
5. 手术前会进行常规检查。
6. 术前6小时禁止饮食。
7. 请除去身上所有衣物(如内衣裤、假牙、饰物和隐形眼镜等)，换上手术衣。
8. 手术前请先排清小便。

## 手术后须知

### 一般情况

1. 全身麻醉后，患儿可能会：
  - 因麻醉时曾插管而引致喉部轻微不适或疼痛；
  - 出现麻醉药的副作用，包括疲倦、渴睡、恶心或呕吐，如情况持续或加剧，请通知护士。
2. 如导尿管已固定好，缝线可在一星期后拆掉。

### 饮食

1. 麻醉药作用消退后，便可按指示恢复正常饮食。
2. 首24-48小时，应摄取较平时多两倍的水分以冲洗整个泌尿系统及减低出血现象。

## 出院后注意事项

1. 如有需要，可服医生处方止痛药。
2. 如伤口部位出现红肿或疼痛、触痛、插入导尿管的部位渗脓或严重出血、腹痛或呕吐、寒颤、发烧(体温达38°C或以上)或其他异常情况，请即联络主诊医生或回院治疗。
3. 如导尿管松脱，应在管道开始愈合前立即重新插入新的导尿管。
4. 请按时复诊。

如家长或监护人对此手术有任何疑问或忧虑，请联络主诊医生。

经过医生的悉心诊治，相信患儿会逐渐康复。

若阅读此章程后有任何查询，请记下相关问题，以便医生作出跟进。祝阁下顺利安好！

---

---

---

由仁安医院手术室管治委员会编辑

以上资料只供参考，详情请向主诊医生查询  
本院保留一切删改此章程之权利，而不作另行通知

