



手術資料

腹腔鏡腎盂成形術 Laparoscopic Pyeloplasty

簡介

腹腔鏡腎盂成形術是以微創手術矯正腎盂與輸尿管交接處阻塞或狹窄的問題。

腎盂與輸尿管交接處阻塞會引致：

- ◆ 疼痛
- ◆ 感染
- ◆ 高血壓
- ◆ 腎石
- ◆ 腎功能衰退

治療成效

此手術可顯著幫助矯正腎盂與輸尿管狹窄或阻塞的問題，從而減低進一步的泌尿科問題及風險。

手術過程

1. 手術會在全身麻醉下進行；
2. 在腹部開數個小切口；
3. 把手術工具經小切口放入腹部；
4. 移除阻塞物，把細小的支架放入輸尿管以連接修復部分及將尿液由腎臟導入膀胱；
5. 通常會放入導尿管以排清尿液。

可能出現的風險及併發症

1. 感染
2. 出血
3. 疝氣(醫生會非常小心地縫合所有微創切口，所以手術部位出現疝氣的機會非常罕見)
4. 腹腔組織或器官受損

** 可能出現之風險或併發症未能盡錄。家長/病人應明白無論手術如何妥善，仍有出現併發症的風險。如附近器官受損、手術後嚴重出血或滲漏時，可能需要進行另一手術治療這些併發症。

手術前的預備

病人必需遵照以下指引，否則可能會延誤或取消手術。

1. 保持個人衛生可預防傷口感染。
2. 醫生會向家長/病人解釋施行手術的原因、程序及可能出現之併發症，家長/病人明白後便可簽署同意書。
3. 請告知醫生及護士所有以往病歷、曾進行過的手術、最近所服用的藥物及因藥物或麻醉而引致的併發症。
4. 麻醉科醫生亦會與家長及病人會面，解釋麻醉的風險及術後須知。
5. 手術前會進行適當的檢查。
6. 術前 6 小時禁止飲食。
7. 請脫下身上所有衣物(例如內衣褲、假牙、飾物和隱形眼鏡等)，然後換上手術衣。
8. 手術前請先排清小便。

手術後須知

一般情況

1. 全身麻醉後，病人可能會:
 - 因麻醉時曾插喉而引致喉部輕微不適或疼痛；
 - 出現麻醉藥的副作用，包括疲倦、渴睡、噁心或嘔吐，如情況持續或加劇，請通知護士。
2. 支架會在手術後的 10–12 星期取出。
3. 視乎個別情況，導尿管可能會在 2–3 天後拔除。

飲食

待麻醉藥效過後，按指示恢復正常飲食。

出院後注意事項

1. 如有需要，可服用醫生處方之止痛藥。
2. 手術後數天，必需多喝水，以排清腎臟廢物。
3. 首 4–6 星期，請避免繁重的家務、提取重物及進行劇烈運動。
4. 如傷口部位的痛楚加劇及出現紅腫、觸痛、滲膿、出血、腹痛或嘔吐、寒顫、發熱(體溫達 38°C 或 100.4°F 以上)或其他異常情況等，請即聯絡主診醫生或回院診治。
5. 請於指定日期、時間及地點覆診。

如病人/家長對此手術有任何疑問或憂慮，請聯絡主診醫生。

經過醫生的悉心診治，相信病人會逐漸康復，並祝生活愉快！

若病人/家長閱讀此單張後有任何查詢，請記下相關問題，以便醫生作出跟進。

由仁安醫院手術室管治委員會編輯

以上資料只供參考，詳情請向主診醫生查詢
本院保留一切刪改此單張之權利，而不作另行通知

