

手術資料

兒童包皮環切術 Circumcision in Children

簡介

包皮是覆蓋在陰莖龜頭上一層較鬆的皮膚皺褶。當包皮過長或過緊，便需進行兒童包皮環切術以切除過剩包皮。此手術的適應症包括：陰莖頭炎、尿道感染復發、包皮過長及嵌頓性包莖。

雖然兒童包皮環切術是一項小手術，但亦需在全身麻醉下進行，以免兒童在手術期間掙扎而阻礙手術進行。

治療成效

包皮環切術是以手術方式切除覆蓋在陰莖的包皮，術後可預防包皮進一步感染。

手術過程

1. 手術會在全身麻醉下進行
2. 切除多餘的包皮及止血
3. 以可吸收的縫線縫合傷口

可能出現的風險及併發症

手術期間及手術後初期：

1. 近陰莖頭、尿道等器官出現損傷，或切除過多包皮
2. 傷口出血
3. 傷口感染
4. 泌尿道感染
5. 結痂及分泌物滲出
6. 急性尿貯積/小便滯留

手術後後期(罕見)：

1. 尿道口狹窄
2. 陰莖出現大面積疤痕
3. 皮贅及皮橋
4. 傷口疤痕出血
5. 陰莖彎曲
6. 勃起緊繃、疼痛
7. 心理及性心理障礙

** 可能出現之風險或併發症未能盡錄。家長或監護人請明白無論手術如何妥善，仍有出現併發症的風險。如附近器官受損、手術後嚴重出血或滲漏時，可能需要進行另一手術治療這些併發症。

手術前的預備

1. 保持個人衛生可預防外科傷口感染。有見於此，院方建議病人於手術當日清洗身體及頭髮。
2. 醫生會向家長或監護人解釋施行手術的原因、程序及可能出現之併發症，家長或監護人明白後便可簽署同意書。
3. 請告知醫生及護士所有兒童以往病歷、曾進行過的手術、最近所服用的藥物及因藥物或麻醉而引致的併發症。
4. 術前 6 小時禁止飲食。
5. 請協助兒童脫下身上所有衣物(例如內衣褲和飾物)，然後換上手術衣。
6. 手術前請提醒兒童先排清小便。

手術後須知

一般情況

1. 全身麻醉後，兒童可能會：
 - 因麻醉時曾插喉而引致喉部輕微不適或疼痛；
 - 出現麻醉藥的副作用，包括疲倦、渴睡、噁心或嘔吐，如情況持續或加劇，請通知護士。
2. 如兒童的傷口感到疼痛，家長或監護人可通知護理人員，護理人員會按醫生指示提供止痛藥。

傷口護理

1. 小便後，需以生理鹽水、蒸餾水或凍滾水沖洗傷口並抹乾。
2. 如出現輕微滲血，應在出血處直接按壓。
3. 利用無底的紙杯覆蓋藥膏或傷口，以減低傷口的磨擦及受壓。宜穿寬鬆衣物，以免傷口受壓。
4. 傷口癒合後，結痂會自動脫落，請勿讓兒童自行除去結痂。
5. 兒童於術後首次排尿時可能感到輕微不適和疼痛，請定時服用醫生處方之止痛藥。
6. 可如常沐浴，但不可在傷口塗上肥皂及在沐浴後保持傷口清潔及乾爽。

飲食

待麻醉藥效消退後，便可按指示恢復正常飲食。

出院後注意事項

1. 請遵照醫生指示服用藥物。
2. 復原期約需 7-10 天。其後兒童便可照常上學。
3. 首兩星期，傷口可能會感到疼痛及腫脹，但無須擔心，徵狀其後會逐漸消退。
4. 請避免踏單車或使用坐騎類型的玩具直至傷口完全癒合。
5. 如傷口部位的痛楚加劇及出現紅腫、惡臭分泌物、滲膿、大量出血、寒顫、發熱(體溫高達 38°C 或 100°F 以上)及排尿困難或其他異常情況等，請即聯絡主診醫生或回院診治。
6. 請於指定日期、時間及地點覆診。

如病人/家長對此手術有任何疑問或憂慮，請聯絡主診醫生。

經過醫生的悉心診治，相信病人會逐漸康復，並祝生活愉快！

若病人/家長閱讀此單張後有任何查詢，請記下相關問題，以便醫生作出跟進。

由仁安醫院手術室管治委員會編輯

以上資料只供參考，詳情請向主診醫生查詢
本院保留一切刪改此單張之權利，而不作另行通知

