

手术资料

儿童包皮环切术 Circumcision in Children

简介

包皮是包在阴茎龟头上一层较松的皮。如果包皮过长或过紧，便需进行儿童包皮环切术切除过长的包皮。手术的适应症包括：阴茎龟头炎、尿道感染复发、包皮过长及嵌顿性包茎。

虽然儿童包皮环切术是一项小手术，但也需在全身麻醉下进行，以免儿童在手术期间挣扎而影响手术进行。

治疗效果

包皮环切术是切除覆盖在阴茎的包皮，术后可预防因包皮过长而引起的感染。

手术过程

1. 手术在全身麻醉下进行
2. 切除多余的包皮及止血
3. 缝合

可能出现的风险及并发症

手术期间及手术后初期：

1. 近阴茎头、尿道等器官出现损伤，或切除包皮过多
2. 刀口出血
3. 刀口感染
4. 泌尿道感染
5. 结痂及有分泌物渗出
6. 急性尿滞留

手术后后期(罕见)：

1. 尿道口狭窄
2. 阴茎出现大面积疤痕
3. 皮赘及皮桥
4. 刀口疤痕出血
5. 阴茎弯曲
6. 勃起紧绷、疼痛
7. 心理及性心理障碍

** 可能出现之风险或并发症未能尽录。家长或监护人请明白无论手术如何妥善，仍有出现并发症的风险。如附近器官受损、手术后严重出血或渗漏时，可能需要进行另一手术治疗这些并发症。

手术前的准备

1. 保持个人卫生可预防刀口感染。患儿于手术当天务必洗澡及洗头。
2. 医生会向家长或监护人解释手术的原因、过程及可能出现之并发症，家长或监护人明白后便须签署同意书。
3. 请告知医生及护士患儿以往病史、曾进行过的手术、最近所服用的药物及因药物或麻醉剂而引致的并发症。
4. 术前6小时禁止饮食。
5. 请协助患儿除去身上所有衣物(如内衣裤和饰物)，换上手术衣。
6. 手术前请患儿先排清小便。

手术后须知

一般情况

1. 全身麻醉后，患儿可能会：
 - 因麻醉时曾插管而引致喉部轻微不适或疼痛；
 - 出现麻醉药的副作用，包括疲倦、渴睡、恶心或呕吐，如情况持续或加剧，请通知护士。
2. 如患儿的刀口部位疼痛，家长或监护人可通知护理人员，护理人员会按医生指示提供止痛药。

刀口护理

1. 小便后，需用生理盐水、蒸馏水或凉开水冲洗并擦干。
2. 如出现轻微渗血，应在出血处直接按压。
3. 利用无底的纸杯覆盖药膏或刀口，以减低刀口的磨擦及受压。宜穿宽松衣服，以免刀口受压。
4. 刀口愈合后，结痂会自动脱落，请勿让儿童自己揭掉结痂。
5. 手术后首次排尿时可能感到轻微不适和疼痛，请定时服用医生处方的止痛药。
6. 可如常沐浴，但不可在刀口用肥皂及在沐浴后保持刀口清洁干燥。

饮食

待麻醉药作用消退后，便可按指示恢复正常饮食。

出院后注意事项

1. 请遵照医生指示服用药物。
2. 复原期约需7-10天。其后儿童便可上学。
3. 首两星期，刀口可能会感到疼痛及肿胀，但无须担心，其后会逐渐消退。
4. 请勿骑车或使用坐骑类型的玩具直至刀口完全愈合。
5. 如刀口部位的疼痛加剧及出现红肿、恶臭分泌物、渗脓、大量出血、寒颤、发烧(体温高达38°C或以上)及排尿困难或其他异常情况，请即联络主诊医生或回院诊治疗。
6. 请按时复诊。

如家长或监护人对此手术有任何疑问或忧虑，请联络主诊医生。

经过医生的悉心诊治，相信患儿会逐渐康复。

若阅读此章程后有任何查询，请记下相关问题，以便医生作出跟进。祝阁下顺利安好！

由仁安医院手术室管治委员会编辑

以上资料只供参考，详情请向主诊医生查询
本院保留一切删改此章程之权利，而不作另行通知

