



## 程序資料

### 胸膜組織檢查 Pleural Biopsy(Needle)

#### 簡介

胸膜組織檢查是一項抽取小塊胸膜組織的程序，抽出的組織會被送往化驗，以確定診斷及決定治療方案。檢查的過程會使用超聲波或電腦掃描，以確定針落在正確的位置。胸膜組織檢查亦可在胸腔鏡協助下進行，讓醫生在整個抽取組織的過程，透過內視鏡觀察病人胸膜腔的情況。

#### 預期成效

取出的組織樣本由病理學家進行檢驗，以作組織學評估。

#### 程序過程

1. 此程序會在局部麻醉下進行。
2. 以超聲波或電腦掃描確定落針位置；及/或  
使用胸腔鏡檢查胸膜腔的情況：
  - i. 在胸腔開一至兩個小切口。
  - ii. 將幼細的胸腔鏡經小切口入胸膜腔。
3. 取得胸膜組織：  
以超聲波或電腦掃描輔助
  - i. 把針經胸腔刺入，放進胸膜腔抽取胸膜組織。  
以胸腔鏡輔助
  - ii. 將內視鏡專用儀器從小切口放入，並抽取胸膜組織。
4. 步驟3可能需要重複進行三至四次，以便取得足夠的胸膜組織。
5. 穿刺位置以無菌敷料覆蓋。
6. 把抽出的胸膜組織送往病理部化驗。

#### 可能出現的風險及併發症

1. 感染
2. 胸腔出血
3. 氣胸 (如徵狀嚴重，可能需要放置導管作胸腔引流)

\*\* 可能出現之風險或併發症未能盡錄。病人應明白無論程序如何妥善，仍有出現併發症的風險。

#### 程序前的預備

1. 醫生會向病人解釋施行程序的原因、過程及可能出現之併發症，病人明白後便可簽署同意書。
2. 請告知醫生及護士所有以往病歷、曾進行過的手術、最近所服用的藥物，及因藥物或麻醉而引致的併發症。
3. 現正或懷疑懷孕的女士，請於程序前通知醫護人員。

4. 病人可能需要進行 X 光和血液檢查。
5. 請按醫生指示停用抗凝血藥物。
6. 如有需要，請在程序前 6 小時禁止飲食。
7. 請脫下身上所有衣物(例如內衣褲、假牙、飾物和隱形眼鏡等)，然後換上手術衣。
8. 程序前請先排清小便。

### **程序後須知**

1. 可即時恢復正常飲食。
2. 可能需要進行 X 光檢查。
3. 24 小時後，可恢復正常活動。數天內，請避免進行劇烈活動。
4. 請保持傷口及敷料清潔乾爽。

### **出院後注意事項**

1. 數天內，檢查部位可能會感到疼痛，病人可按照醫生指示服用止痛藥。
2. 傷口的敷料通常可於 48 小時後移除，請按醫護人員指示護理傷口。
3. 如出現呼吸困難、傷口疼痛增加或腫脹、流出血液或分泌物、胸痛、咳血、寒顫、發熱(體溫 38°C 或 100°F 以上)等，請即聯絡主診醫生或回院診治。
4. 請於指定日期、時間及地點覆診。

如對此程序有任何疑問或憂慮，請聯絡主診醫生。

經過醫生的悉心診治，相信會逐漸康復，並祝生活愉快！

若閱讀此單張後有任何查詢，請記下相關問題，以便醫生跟進。

---

---

---

由仁安醫院手術室管治委員會編輯

以上資料只供參考，詳情請向主診醫生查詢  
本院保留一切刪改此單張之權利，而不作另行通知