



检查资料

胸膜组织检查 Pleural Biopsy(Needle)

简介

胸膜组织检查是一项抽取小块胸膜组织的程序，将抽出的组织检验，诊断及决定治疗方案。检查的过程会使用超声波或电脑扫描，以确定下针的正确位置。胸膜组织检查也可在胸腔镜协助下进行，医生在整个抽取组织的过程，可透过内视镜观察患者胸膜腔的情况。

预期成效

取出的组织由病理学家检验，作组织学评估。

检查过程

1. 此检查会在局部麻醉下进行。
2. 用超声波或电脑扫描确定下针位置；及/或使用胸腔镜检查胸膜腔的情况：
 - i. 在胸腔开一至两个小切口。
 - ii. 将胸腔镜经小切口放入胸膜腔。
3. 取得胸膜组织：
用超声波或电脑扫描辅助
 - i. 针经胸腔进入，放进胸膜腔抽取胸膜组织。
用胸腔镜辅助
 - ii. 将内视镜专用仪器从小切口放入，并抽取胸膜组织。
4. 步骤3可能需要重复进行三至四次，以便取得足够的胸膜组织。
5. 穿刺位置用无菌敷料覆盖。
6. 把取出的胸膜组织送到病理部检验。

可能出现的风险及并发症

1. 感染
2. 胸腔出血
3. 气胸 (如症状严重，可能需要放置导管作胸腔引流)

** 可能出现之风险或并发症未能尽录。患者应明白无论过程如何妥善，仍有出现并发症的风险。

检查前的准备

1. 医生会向患者解释检查的原因、过程及可能出现之并发症，患者明白后便须签署同意书。
2. 请告知医生及护士所有以往病史、曾进行过的手术、最近所服用的药物，及因药物或麻醉剂而引致的并发症。
3. 现正或怀疑怀孕的女士，请于检查前通知医护人员。

4. 可能需要进行 X 光和血液检查。
5. 请按医生指示停用抗凝血药。
6. 如有需要，请在检查前 6 小时禁止饮食。
7. 请除去身上所有衣物(如内衣裤、假牙、饰物和隐形眼镜等)，换上手术衣。
8. 检查前请先排清小便。

检查后须知

1. 可实时恢复正常饮食。
2. 可能需要进行 X 光检查。
3. 24 小时后，可恢复正常活动。数天内，请勿做剧烈活动。
4. 请保持伤口及敷料清洁干燥。

出院后注意事项

1. 数天内，检查部位可能会感到疼痛，可按照医生指示服止痛药。
2. 伤口的敷料通常可于 48 小时后摘掉，请按医护人员指示护理伤口。
3. 如出现呼吸困难、伤口疼痛增加或肿胀、流出血液或分泌物、胸痛、咳血、寒颤、发烧(体温 38°C 或 100°F 以上)等，请即联络主诊医生或回院治疗。
4. 请按时复诊。

如对此检查有任何疑问或忧虑，请联络主诊医生。

经过医生的悉心诊治，相信会逐渐康复。

若阅读此章程后有任何查询，请记下相关问题，以便医生跟进。祝阁下顺利安好！

由仁安医院手术室管治委员会编辑

以上资料只供参考，详情请向主诊医生查询
本院保留一切删改此章程之权利，而不作另行通知