




手术资料

纵隔镜检查/纵隔切开术 Mediastinoscopy/ Mediastinotomy

简介

纵隔镜检查和纵隔切开术是在全身麻醉下进行的手术。医生会从胸部附近的气道及大血管的淋巴抽取淋巴结组织进行活检(诊断或判断肺部恶性肿瘤的期数),或切除纵隔肿瘤或淋巴结。



图片来源:
<https://www.cancer123.com/d/file/news/2020-09-01/8b1c01122f8bd2a2c0e613ce52e5a5f0.jpg>

治疗效果

此手术可观察及检查胸腔内的淋巴结和其他异常情况,如有需要,医生也会抽取组织标本送往病理部检验。

手术过程

1. 此手术会在全身麻醉下进行;
2. 纵隔镜检查将在颈底部切小切口,医生在该位置抽取组织;而纵隔切开术将在胸前切一小切口,医生在该位置抽取组织或切除肿瘤或淋巴结;
3. 抽取的组织送往病理部检验;
4. 缝合。

可能出现的风险及并发症

1. 刀口出血
2. 刀口感染
3. 抽取的组织不足以确诊及就结果制定进一步治疗
4. 因穿刺意外而导致血管出血(极为罕见)
5. 神经受损
6. 气胸(空气积聚在胸腔内)
7. 乳糜胸(乳糜液积聚在胸腔内)

** 可能出现之风险或并发症未能尽录。患者应明白无论手术如何妥善,仍有出现并发症的风险。如附近器官受损、手术后严重出血或渗漏时,可能需要进行另一手术治疗这些并发症。

手术前的准备

1. 保持个人卫生可预防刀口感染。患者于手术当天务必洗澡及洗头。
2. 医生会向患者解释手术的原因、过程及可能出现之并发症，患者明白后便须签署同意书。
3. 请告知医生及护士所有以往病史、曾进行过的手术、最近所服用的药物及因药物或麻醉剂而引致的并发症。如正服用影响血液凝固的药物，例如阿斯匹林(Aspirin)、华法林(Warfarin)、拜瑞妥(Xarelto)或百达生(Pradaxa)或非类固醇抗炎药，例如布洛芬(Ibuprofen)、萘普生(Naproxen)及中药，请尽早通知医生。
4. 护士会提供外科皂液予患者清洗身体，请注意清洗胸部位置。
5. 术前 6 小时禁止饮食。
6. 请除去身上所有衣物(如内衣裤、假牙、饰物和隐形眼镜等)，换上手术衣。
7. 手术前请先排清小便。

手术后需知

一般情况

1. 全身麻醉后，患者可能会：
 - 因麻醉时曾插管而引致喉部轻微不适或疼痛；
 - 出现麻醉药的副作用，包括疲倦、渴睡、恶心或呕吐，如情况持续或加剧，请通知护士。
2. 如刀口部位疼痛，可通知护士，护士会按医生指示注射止痛针或提供口服止痛药。

刀口护理

1. 手术后会用消毒纱布覆盖刀口，请保持敷料干燥。
2. 如有需要，医生会安排清洗刀口。
3. 可如常淋浴(如使用防水敷料)，其后请保持刀口清洁干燥。

出院后注意事项

1. 请按照医生指示服药。
2. 如出现呼吸困难、刀口肿胀及渗液、咳血、寒颤、发热(体温高达 38°C 或以上)或其他异常情况，请即联络主诊医生或回院诊治。
3. 请按时复诊。

如您对此手术有任何疑问或忧虑，请联络主诊医生。

经过医生的悉心治疗，相信您会逐渐康复。

若您阅读此章程后有任何查询，请记下相关问题，以便医生作出跟进。祝阁下顺利安好！

由仁安医院手术室管治委员会编辑

以上资料只供参考，详情请向主诊医生查询
本院保留一切删改此章程之权利，而不作另行通知

