



手術資料

輸精管結紮手術 Vasectomy

簡介

輸精管結紮手術是通過手術把輸精管阻斷。此手術不會影響性慾及性功能。

治療成效

輸精管結紮手術是男性永久避孕的方法，雖然身體內仍會製造精子，但精液內不含精子，術後約 8-12 星期後按指定日期內，提交精液樣本作化驗，確定精液沒有精子後，一般無需使用其他避孕方法。

手術過程


1. 手術可在監測、局部或全身麻醉下進行；
2. 醫生找出輸精管的位置；
3. 在陰囊上開一小孔或小切口；
4. 截斷或切除部分輸精管。

可能出現的風險及併發症

1. 陰囊皮膚瘀傷
2. 輕微疼痛或不適
3. 傷口感染
4. 傷口出血及陰囊積血
5. 精液內有血絲
6. 精子肉芽腫
7. 慢性痛症(罕見)
8. 輸精管可能會在一段時間後自然接合 (罕見，1/2000)

** 可能出現之風險或併發症未能盡錄。客人應明白無論手術如何妥善，仍有出現併發症的風險。如附近器官受損、手術後嚴重出血或滲漏時，可能需要進行另一手術治療這些併發症。

輸精管結紮手術
Vasectomy



圖片來源：
<https://my.clevelandclinic.org/-/scassets/Images/org/health/articles/4423-vasectomy.jpg>

手術前的預備

1. 保持個人衛生可預防外科傷口感染。
2. 醫生會向客人解釋施行手術的原因、過程及可能出現之併發症，客人明白後便可簽署同意書。
3. 請告知醫生及護士所有以往病歷、曾進行過的手術、最近所服用的藥物及因藥物或麻醉而引致的併發症。如正服用影響血液凝固的藥物，例如阿士匹靈(Aspirin)、華法林(Warfarin)、拜瑞妥(Xarelto)或百達生(Pradaxa)及中藥，請儘早通知醫生。
4. 需要時會進行常規檢查。
5. 護理人員會按需要協助客人剃掉手術部位的毛髮，並提供外科皂液給客人清洗手術部位。
6. 術前 6 小時禁止飲食。(只適用於全身麻醉)
7. 請脫下身上所有衣物(例如內衣褲、假牙、飾物和隱形眼鏡等)，然後換上手術衣。
8. 手術前請先排清小便。

手術後須知

一般情況

1. 全身麻醉後，客人可能會：
 - 因麻醉時曾插喉而引致喉部輕微不適或疼痛；
 - 出現麻醉藥的副作用，包括疲倦、渴睡、噁心或嘔吐，如情況持續或加劇，請通知護士。
2. 如傷口部位疼痛，可通知護士，護士會按醫生指示為客人注射止痛針或提供口服止痛藥。
3. 首數天，陰囊通常會有輕微不適、腫脹及瘀傷。
4. 首數次射出之精液內有血絲屬正常現象。
5. 客人通常可在手術後當天出院。

飲食

待麻醉藥作用消退後，便可按指示恢復正常飲食。

出院後注意事項

1. 如有需要，可服食醫生處方之止痛藥。
2. 客人可穿著具承托力的內褲以減低不適及腫脹。
3. 如已感到無恙，便可恢復性生活，但必須繼續採用避孕措施，直至醫生確定精液內已沒有精子。
4. 術後首星期應避免提取重物及進行劇烈運動。
5. 3-7 天後便可恢復正常活動。
6. 客人可如常沐浴。
7. 如傷口部位的疼痛加劇及出現紅腫、滲膿、大量出血、寒顫、發熱(體溫高於38°C或100.4°F)或其他異常情況等，請即聯絡主診醫生或回院診治。
8. 請於指定日期、時間及地點覆診。

如客人對此手術有任何疑問或憂慮，請聯絡主診醫生。

經過醫生的悉心診治，相信客人會逐漸康復，並祝生活愉快！

若客人閱讀此單張後有任何查詢，請記下相關問題，以便醫生作出跟進。

由仁安醫院手術室管治委員會編輯

以上資料只供參考，詳情請向主診醫生查詢
本院保留一切刪改此單張之權利，而不作另行通知

