

## 耐药性金黄色葡萄球菌除菌疗程

### 除菌疗程

您的医生会为您处方以下的外用除菌疗程(如您对有关药物没有禁忌症)：

#### (一) 4% chlorhexidine gluconate 消毒皂液(Microshield 4%)

- 洗澡：每日一次，把消毒液涂满全身，连续用七天；及
- 洗发：在第一、第三、第五及第七天涂在头发及头皮上。

使用方法：把消毒皂液涂在全身、头发及头皮上一分钟后再用清水冲干净。

#### (二) 2% mupirocin 药膏(Bactroban 或其他含有同样有效成分的药品)

- **擦**两侧鼻孔，每日三次，连续用七天。

使用方法：挤出适量(如火柴头般大小)的药膏，然后把药膏**擦**在其中一侧鼻孔内，于另一侧鼻孔重复以上步骤；再用**拇指**及**食指捏住**鼻孔两侧，并前后移动手指按摩，使药膏能均匀地涂在鼻孔内。若有需要，可用棉花棒协助**擦**药膏。患者可能会在鼻咽和喉咙等部位感觉到药膏的味道，这属正常现象。

**注**：一般不建议**两个月**以下**婴儿**使用除菌药物。

### 注意事项

上述两种药物(4% chlorhexidine gluconate 消毒皂液及 2% mupirocin 药膏)皆只供外用，请勿吞服，并应放在儿童接触不到的地方。

#### (一) 4% chlorhexidine gluconate 消毒皂液/Microshield 4%

- 避免接触眼睛及身体黏膜表面如口腔黏膜、鼻黏膜。如本药接触了眼睛，请以快速流动的水洗掉。如不慎意外接触黏膜部位，应用清水冲洗。
- 少数人可能会对本药有过敏反应，如发现有刺激性皮肤炎的现象，请立即停用并求诊。
- 请勿将本药与肥皂**同**用。
- 含次氯酸钠(sodium hypochlorite)的漂白水可能会使曾接触本药的纺织品或衣物**掉**色。

#### (二) 2% mupirocin 药膏/Bactroban

- 只供是次除菌用，使用者不要保留剩余的药品供日后使用或作其他用途，否则会引致细菌的抗药性和治疗失效。

资料由仁安医院提供  
以上资料只供参考，详情请向主诊医生查询  
本院保留一切删改此章程之权利，而不作另行通知