

耐藥性金黃葡萄球菌除菌療程

除菌療程

你的醫生會為你處方以下的外用除菌療程(如你對有關藥品沒有禁忌症)：

(一) 4% chlorhexidine gluconate 消毒梘液(Microshield 4%)

- 洗澡：每日一次，把消毒液塗滿全身，連續用七天；及
- 洗髮：在第一、第三、第五及第七天塗在頭髮及頭皮上。

使用方法：把消毒梘液塗在全身、頭髮及頭皮上一分鐘後才用清水沖淨。

(二) 2% mupirocin 藥膏(Bactroban 或其他含有同樣有效成份的藥品)

- 塗抹兩邊鼻孔，每日三次，連續用七天。

使用方法：擠出適量(如火柴頭般大小)的藥膏，然後把藥膏塗抹其中一個鼻孔內，於另一個鼻孔重複以上步驟；再用母指及食指按著鼻孔兩側以閉合鼻孔，並前後移動手指作出按摩，使藥膏能均勻地塗抹在鼻孔之內。若有需要，可用棉花棒協助塗抹藥膏。病人可能會在鼻咽和喉嚨等部位感覺到藥膏的味道，這屬正常現象。

註：一般不建議兩個月以下嬰兒使用除菌藥品。

注意事項

上述兩種藥品(4% chlorhexidine gluconate 消毒梘液及 2% mupirocin 藥膏)皆只供外用，請勿吞服，並應放在兒童不能接觸的地方。

(一) 4% chlorhexidine gluconate 消毒梘液/Microshield 4%

- 避免接觸眼睛及身體黏膜表面如口腔黏膜、鼻黏膜。如本藥品接觸眼睛，請以快速流動的水洗掉。如不慎意外接觸黏膜部位，應以清水沖洗。
- 少數人可能會對本藥品有過敏反應，如發現有刺激性皮膚炎的現象，請立即停用並求診。
- 請勿將本藥品與肥皂並用。
- 含次氯酸鈉(sodium hypochlorite)的漂白水可能會使曾接觸本藥品的紡織品或衣物着色。

(二) 2% mupirocin 藥膏/Bactroban

- 只供是次除菌之用，使用者不要保留剩餘的藥品供日後使用或作其他用途，否則會引致細菌的抗藥性和治療失效。

資料由仁安醫院提供
以上資料只供參考，詳情請向主診醫生查詢
本院保留一切刪改此單張之權利，而不作另行通知