

慣性流產的婦女 在早期懷孕前的準備

一般而言，慣性流產是指連續兩次或以上的自發性流產。僅超過1%的婦女會曾經出現連續兩次或以上的自發性流產。

引致慣性流產原因/對應的檢查/治療，詳情請參考仁安生殖醫學中心慣性流產資料單張。

根據醫學文獻顯示，只有半數慣性流產個案能確定原因。慣性流產的原因包括：

- | | |
|-----------------|---------|
| 1. 胚胎因素 – 染色體異常 | 5. 免疫因素 |
| 2. 子宮結構異常 | 6. 宮頸鬆弛 |
| 3. 內分泌失調 | 7. 子宮感染 |
| 4. 血栓傾向 | 8. 原因不明 |

患者有機會要進行以下檢查來找出慣性流產的原因。由於慣性流產的原因可能多於一個，因此患者可能需要進行多項檢查。

- | | |
|-----------|-----------|
| 1. 染色體檢查 | 4. 血栓傾向檢查 |
| 2. 子宮結構分析 | 5. 免疫檢查 |
| 3. 荷爾蒙檢查 | |

宮頸鬆弛的治療

宮頸鬆弛通常會引致妊娠第二期(14–28週)流產，而非妊娠初期(13週前)。在典型的宮頸鬆弛個案中，孕婦會在妊娠第二期突然穿羊水，然後發生無痛流產。若是宮頸鬆弛有可能是中期流產的原因，可以在孕婦懷孕期間定期進行超聲波評估子宮頸長度。如有需要，可以將宮頸縫合來強化宮頸。

再次懷孕的監測和支援

為減少流產風險，你會希望在下次懷孕時增加監察。當你發現懷孕時，你可以聯絡我們(電話：3126 1263)，我們會為你安排定期的荷爾蒙和超聲波檢查，以及提供專業意見。

如果流產了，怎麼辦？

流產是指胚胎或胎兒已經停止發育，停留在宮腔內沒有及時自然排出的情況。一般流產的治療方法有兩種，包括藥物引流和吸宮。

手動式真空抽吸術 (MVA)

仁安早孕中心引進一項新的技術手動式真空抽吸術 (Manual Vacuum Aspiration)。MVA是治療早期流產的一個簡單而有效的方法。傳統的刮宮手術需要在手術室裏，及要全身麻醉的情況下進行。而MVA是簡單地使用特殊設計的手動真空抽吸器，去清除流產組織。MVA治療過程是微創的，因為它可以在門診、無需全身麻醉下進行，而且治療過程不需要用任何電動吸引機器。如果你想了解更多這個療程，請掃描QR Code瀏覽短片。



瀏覽短片

祝君好孕



仁安早孕中心

九龍尖沙咀中間道15號 H Zentre 12樓

電話: 3126 1263



港鐵 MTR

港鐵尖東站 K 出口，步行約1分鐘



www.union.org/epc



CCMIEPC-202206

本院保留一切更改或刪改此單張內容之權利，而不作另行通知。
Union Hospital reserves the RIGHT to amend any information in this leaflet without prior notification.

仁安早孕中心 Union Early Pregnancy Clinic



預約及查詢
For Booking and Enquiries
3126 1263

仁心、安心、貼您心
Caring • Reliable • Empathetic

仁安早孕中心 為早孕準媽媽提供完善服務，倍感安心

於2021年8月正式成立，提供24小時支援及一站式的服務。團隊由專業醫護人員組成，包括專科醫生和護士，由急症門診分流，病房專業護士解答及預約專科門診，安排住院服務，務求盡力協助準媽媽在早孕過程得到安心照顧和治療。



何謂早孕？

早期妊娠是指妊娠第14週以前的階段，此階段正是受精卵分裂成為胚胎，然後成為胎兒的重要時期。在懷孕初期，母體內的雌激素、黃體酮及催乳素均會急升，引起孕婦一些不適。妊娠早期會有妊娠反應，感覺頭暈乏力、倦怠嗜睡，並且食慾減退。有些人還可能有食慾異常、挑食、喜酸味和厭油膩。



我們的服務



1 鑑定懷孕

一般情況下有以下簡單方法測試早孕結果：

驗孕棒：懷孕初期，女性體內會產生一種妊娠荷爾蒙hCG(Human Chorionic Gonadotropin)。驗孕棒使用方法簡單，早上起床後用第一次尿液進行測定，利用其特有色素顯示反應，便能準確測試尿液的hCG含量。月經週期穩定者，可於遲經後當天或之後的任何時間進行測試。懷孕初期，尿液樣本中的妊娠荷爾蒙可能不足以顯示應有反應，所以當測試顯示沒有懷孕後一星期，若月經仍未至，請重新測試或諮詢醫生。月經週期不穩定者，應以對上一次月經週期計定出預期的來經日子，於遲經後一星期進行測試。當測試顯示沒有懷孕後一星期，若月經仍未至，請重新測試或諮詢醫生。

抽血化驗Beta-hCG指數：仁安早孕中心提供快速血液測試，大概1小時內便能檢測血清的Beta-hCG含量。抽血驗hCG比驗小便（驗孕棒）更加精準，亦可用來監察胎兒著床是否正常。在著床初期（6週之前）hCG的指數會每48小時就會翻倍。如果驗孕棒顯示懷孕或覺得自己有懷孕的可能，請立即預約我們的婦產科醫生。



2 確定懷孕位置

仁安早孕中心擁有先進的設備，嶄新的超聲波儀器，提供清晰的影像，以及專業的婦產科/生殖醫學科醫生。在準媽媽的5–6週孕期，醫生便可用陰道超聲波儀器確定懷孕位置，預期可以觀察到妊娠囊和卵黃囊，以確定胎兒著床位置。

3 預防及護理先兆流產「作小產」

「作小產」多發生在懷孕初期，部分孕婦都經歷過這種情況；一般有以下情況出現：陰道輕微出血，並無胎兒組織排出；間歇輕微的下腹痛或者完全沒有痛。而多於一半有先兆流產徵狀的孕婦都可以懷孕至產期。仁安早孕中心的專科醫生，會儘快協助檢查，診斷及治療，如情況穩定，不一定需要入院留醫，可在家中繼續觀察。如有需要，醫生會按需處方藥物(俗稱安胎藥)給予孕婦回家使用。醫生處方的荷爾蒙藥(俗稱安胎藥)有不同種類，大部分安胎藥以塞陰道方法，部分藥可以經肛門途徑，少部分以口服方式。先兆流產「作小產」的孕婦要有充足的休息，避免受傷、劇烈運動、過度疲勞，暫停性生活。

4 密切監察，及早發現較高風險 出現懷孕併發症

有些婦女會有較高機會有早期懷孕併發症，例如：曾經有宮外孕、慣性流產、宮頸機能不全的婦女，等等。對於曾經流產的準媽媽，仁安早孕中心醫生會用超聲波檢查作密切監測，可以確認子宮內有正常的妊娠囊、卵黃囊和胎兒，監察胎兒心跳；確定孕期及預產期，胎兒數目，以及排除盆腔腫塊或子宮異常。醫生亦都會因應準媽媽的懷孕歷史，來安排相應的檢查和治療。



本中心婦產科醫生的建議

驗孕棒顯示懷孕


儘快抽血化驗 Beta-hCG指數，女性在懷孕後，體內會分泌人類絨毛膜促性腺激素(hCG)，即懷孕期間所製造的荷爾蒙，受孕後的女性血液中hCG會迅速增加，通常會48小時hCG指數會翻倍。

一星期後再抽血化驗 Beta-hCG指數（如有需要）
醫生會根據你的Beta-hCG 指數而安排照超聲波的日子（通常在大概5至6週的時候），確定懷孕。

一般情況下，5週會見到妊娠囊。隨著妊娠囊生長，裏面會長出卵黃囊、然後胚芽。大概6–7週左右就會看到心跳。

5 懷孕前診斷性宮腔鏡檢查

診斷性宮腔鏡檢查用於檢查子宮腔內是否有肌瘤、瘻肉、黏連或先天性子宮結構異常等情況，評估女性不育、多次人工受孕(試管嬰兒)失敗、習慣性流產或子宮異常出血。診斷性宮腔鏡檢查可於中心施行，整個檢查約需10–15分鐘。通常建議在月經結束後，沒有懷孕的情況下進行。確定宮腔的結構和功能正常，可以減低流產的風險。有需要時可同時進行簡單手術，如摘除瘻肉、分割黏連和抽取子宮內膜化驗。



其他資訊

陰道出血



大約每100名孕婦中，>10%於懷孕初期會出現陰道輕微出血的情況，當中有部分可能成為流產，其餘的都會安然渡過懷孕期，稱為先兆流產(俗稱作小產)。經醫生檢查及診症後，如情況穩定，不一定需要入院留醫，可在家中繼續觀察。但有些先兆流產可演變成真正流產。

宮外孕

宮外孕，即是胚胎生長在子宮腔以外的地方，如輸卵管內、卵巢、子宮外的腹腔或子宮頸等等。宮外孕通常腹部會出現痛楚，陰道有不正常的流血現象，如沒有及時發現，有機會出現內出血，血壓會降低及心跳會變快，有生命危險。仁安早孕中心，有先進的3D超聲波儀器，以陰道探頭進行檢測，準確找出胚胎著床的位置。