



手術資料

乳腺管切除術 Microdochectomy

簡介

乳腺管切除術是一項將異常分泌的乳腺管切除的外科手術。

治療成效

此手術目的是切除乳腺管以診斷及治療。

手術過程

1. 在全身麻醉下進行；
2. 利用導絲(guide wire)或藍色染劑(blue dye)定位，找出有不正常分泌的乳腺管並切除。



可能出現的風險及併發症

1. 傷口感染
2. 傷口積血(需再進行手術清除血塊)

** 可能發生之風險或併發症未能盡錄。病人應明白無論手術如何妥善，仍有發生併發症的機會。如附近器官受損、手術後嚴重出血或滲漏時，可能需要進行另一手術治療這些併發症。

手術前的預備

1. 保持個人衛生可預防外科傷口感染。有見於此，院方建議病人於手術當日清洗身體及頭髮。
2. 醫生會向病人解釋施行手術的原因、程序及可能出現之併發症，病人明白後便可簽署同意書。
3. 請告知醫生及護士所有以往病歷、曾進行過的手術、最近所服用的藥物及因藥物或麻醉而引致的併發症。
4. 手術前按護理人員指導以消毒劑清潔皮膚，護理人員會按需要協助病人剃掉手術部位的毛髮。
5. 醫生會用外科手術記號筆標記手術位置，請勿洗掉。
6. 術前6小時禁止飲食。
7. 請脫下身上所有衣物(例如內衣褲、假牙、飾物和隱形眼鏡等)，然後換上手術衣。
8. 手術前請先排清小便。

手術後須知

一般情況

1. 全身麻醉後，病人可能會：
 - 因麻醉時曾插喉而引致喉部輕微不適或疼痛；
 - 出現麻醉藥的副作用，包括疲倦、渴睡、噁心或嘔吐，如情況持續或加劇，請通知護士。
2. 如傷口部位疼痛，可通知護士，護士會按醫生指示為病人注射止痛針或提供口服止痛藥。

傷口處理

1. 手術後，傷口已蓋上無菌敷料及防水膠布，毋須特別料理。
2. 請保持傷口清潔乾爽。
3. 手術後宜穿寬鬆衣物，以免傷口受壓，上衣以開胸式為佳。

飲食

在一般情況下，待麻醉藥作用過後，便可逐漸恢復正常飲食，毋須戒口。

活動

1. 飲食後，如無不適，便可以下床活動，需要時可服食止痛藥。
2. 盡早下床活動有助迅速康復，宜每日逐漸增加活動量，以可以應付而不感疲倦為佳。

出院後注意事項

1. 視乎病況，一般在手術後翌日便可出院。
2. 手術後配戴合適的胸圍可減輕痛楚。
3. 沒有限制，可自由活動。
4. 如傷口部位疼痛加劇或出現紅腫、觸痛、濃性滲液、滲血、寒顫、發熱(體溫 38°C 或 100.4°F 以上)或其他異常情況等，請即聯絡主診醫生或回院診治。
5. 請於指定日期、時間及地點覆診。

如病人對此手術有任何疑問或憂慮，請聯絡主診醫生。

經過醫生的悉心診治，相信病人會逐漸康復，並祝生活愉快！

若病人閱讀此單張後有任何查詢，請記下相關問題，以便醫生作出跟進。

由仁安醫院手術室管治委員會編輯

以上資料只供參考，詳情請向主診醫生查詢
本院保留一切刪改此單張之權利，而不作另行通知