




检查资料

超声内镜检查 Endoscopic Ultrasound (EUS)

简介


超声内镜是一种结合内视镜及超声波的常用外科仪器，此仪器能有效用于观察器官内部的组织和结构。由于其附在内视镜头部的超声波仪器可深入患者体内，靠近病源进行检查，所以诊断结果较为准确。



预期效果

此检查应用于：

- 观察：观察消化道的表面
- 诊断：多年研究数据显示，此检查能诊断食道、胃、胰、胆、肝、大肠及肺部的疾病，在诊断癌症分期上的成效尤为显著
- 导引：在超声内镜的显示下进行微针穿刺抽取细胞组织化验以确定病因，以及进行各类注射治疗
- 治疗：例如腹腔神经丛阻滞及胰脏假性囊肿引流术



图片来源：

<https://www.mayoclinic.org/-/media/kcms/gbs/patient-consumer/images/2017/03/17/16/40/pancreatic-ultrasound-8col.jpg>

检查过程

1. 检查可经静脉注射适量镇静剂或在监测麻醉下进行；
2. 在患者的喉部喷上局部麻醉药，随即把超声内镜经口部放进体内进行检查；
3. 检查期间，患者可能会感到恶心及上腹膨胀不适；
4. 根据个人情况而定，整个内镜检查一般需时约 15 至 60 分钟。

可能出现的风险及并发症

1. 数小时内，喉部麻醉药会引致吞咽困难。
2. 肠道穿孔、出血、心肺并发症等(罕见)。
3. 超声内镜微针穿刺或组织抽取的检查风险会根据检查部位而定，包括纵隔炎、胰脏炎或感染。
4. 腹腔神经丛阻滞的风险包括短暂性腹泻，短暂性血压不稳，短暂性腹痛或脓疮形成。

** 可能出现之风险或并发症未能尽录。患者应明白无论检查如何妥善，仍有出现并发症的风险。

检查前的准备

1. 医生会向患者解释做此检查的原因、过程及可能出现之并发症，患者明白后便须签署同意书。
2. 请告知医生及护士所有以往病史、曾进行过的手术、最近所服用的药物及因药物或麻醉剂而引致的并发症。如正服用影响血液凝固的药物，例如阿斯匹林(Aspirin)、华法林(Warfarin)、拜瑞妥(Xarelto)或百达生(Pradaxa)及中药，请尽早通知医生。
3. 检查前 6 小时禁止饮食。

检查后须知

麻醉药作用消退后，便可按医生指示恢复正常饮食。

出院后注意事项

1. 请按医生指示，完成整个服药疗程。
2. 如持续呕吐、大量出血、腹部剧烈胀痛或不适、寒颤、发烧(体温高达 38°C 或以上)或其他异常情况，请即联络主治医生或回院治疗。
3. 请按时复诊。

如您对此手术有任何疑问或忧虑，请联络主治医生。

经过医生的悉心治疗，相信您会逐渐康复，并祝生活愉快！

若您阅读此章程后有任何查询，请记下相关问题，以便医生作出跟进。祝阁下顺利安好！

由仁安医院手术室管治委员会编辑

以上资料只供参考，详情请向主诊医生查询
本院保留一切删改此章程之权利，而不作另行通知